

急性缺血性卒中中等血管闭塞管理 中国专家共识2024

■ 中国卒中学会神经介入分会

【摘要】 《急性缺血性卒中中等血管闭塞管理中国专家共识2024》是由中国卒中学会神经介入分会组织专家根据近年来血管内治疗急性颅内中等血管闭塞领域研究的新进展和新的循证医学证据进行的分析和总结。此次共识编写涵盖颅内中等血管的定义、中等血管闭塞的发病率、预后、诊断、静脉/动脉溶栓治疗、血管内治疗以及具体的血管内治疗技术等内容，旨在为从事卒中防治尤其是急性缺血性卒中血管内治疗、护理及康复的相关专业人员和社会工作者，以及政府相关管理机构、卫生事业管理人员、医药企业、卫生保健需求方和其他利益相关者提供指导意见。

【关键词】 血管内治疗；中等血管闭塞；缺血性卒中；专家共识；证据；推荐

【中图分类号】 R74

【DOI】 10.3969/j.issn.1673-5765.2024.11.011

通信作者单位

北京 100070

首都医科大学附属北京

天坛医院神经病学中心

介入神经病学科 (缪中荣)

陆军军医大学西南医院

神经内科 (陈康宁)

通信作者

缪中荣

zhongrongm@163.com

陈康宁

ckn_640827@126.com

Chinese Expert Consensus on the Management of Medium Vessel Occlusion in Acute Ischemic Stroke 2024

Chinese Interventional Neuroradiology Society of Chinese Stroke Association. Department of Interventional Neuroradiology, Department of Neurology, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100070, China (MIAO Zhongrong); Department of Neurology, The Southwest Hospital of Army Medical University, Chongqing 400038, China (CHEN Kangning)

Corresponding Author: MIAO Zhongrong, E-mail: zhongrongm@163.com

CHEN Kangning, E-mail: ckn_640827@126.com

【Abstract】 *Chinese Expert Consensus on the Management of Medium Vessel Occlusion in Acute Ischemic Stroke 2024* is a summary and analysis conducted by experts organized by the Chinese Interventional Neuroradiology Society of Chinese Stroke Association, based on recent advancements and new evidence-based medical findings in the field of endovascular treatment for acute intracranial medium vessel occlusion. This consensus covers the definition of intracranial medium vessels, the incidence, prognosis, diagnosis, intravenous thrombolysis/intra-arterial thrombolysis, endovascular treatment, and specific techniques of endovascular treatment. The aim is to provide guidance for professionals and social workers engaged in stroke prevention and treatment, especially those specializing in endovascular treatment, nursing, and rehabilitation of acute ischemic stroke, as well as relevant governmental agencies, healthcare administrators, pharmaceutical companies, healthcare demand parties, and other stakeholders.

【Key Words】 Endovascular treatment; Medium vessel occlusion; Ischemic stroke; Expert consensus; Evidence; Recommendation

1 推荐形成和分级说明

大血管闭塞 (large vessel occlusion, LVO) 所致急性缺血性卒中 (acute ischemic stroke, AIS) 患者可以从血管开通中获益已经被证实10年，血管内治疗为LVO所致AIS提供了更多良好预后的可能，但对远端中等血管

闭塞 (medium vessel occlusion, MeVO) 所致AIS能否与LVO所致AIS一样可以从血管开通中获益，目前仍不明确。

虽然与LVO相比，MeVO所致AIS的脑缺血范围较小，但依然具有较高的致残和致死率，影响患者的临床预后^[1-4]。近年来，MeVO的开

通治疗得到了更多的关注。本共识结合最新的临床研究成果和专家意见,对MeVO所致AIS的临床评估和血管内治疗策略提供意见和建议,旨在推进临床对MeVo的认识和规范化治疗。

本共识采用改良德尔菲法,使用Likert 5分量表表示同意程度,以专家投票的形式决定推荐分级。每项推荐设置5个选项:①强烈推荐(5分);②弱推荐(4分);③无明确推荐意见(3分);④弱不推荐(2分);⑤强不推荐(1分)。在每一轮投票中,分别计算每个选项的平均分、中位分、四分位间距和得分在中位之外的投票占比;简化推荐分级标准,计算 ≥ 4 分的专家投票占比和投票平均分,将推荐意见分级分为I级、II级、III级、IV级。推荐分级见表1。

2 中等血管闭塞的定义

传统的MeVO是指管腔直径0.75~2 mm的脑血管闭塞,这个概念最大的争议在大脑中动脉(middle cerebral artery, MCA) M2段(直径1.1~2.1 mm的M2段)闭塞是否属于MeVO。远端取栓峰会小组(Distal Thrombectomy Summit Group)最近提出了一种界定远端中等血管的概念,该概念不仅考虑脑血管的直径,还同时考虑闭塞的远近与血管的迂曲程度,相对于近端LVO, MeVO包括以下血管闭塞且血管直径在0.75~2 mm,涵盖脑血管25个解剖节段和34个动脉分支:①MCA的M2~M4段;②大脑前动脉(anterior cerebral artery, ACA);③小脑前下动脉(anterior inferior cerebellar artery, AICA);④小脑后下动脉(posterior inferior cerebellar artery, PICA);⑤小脑上动脉(superior cerebellar artery, SCA);⑥大脑后动脉(posterior cerebral artery, PCA)^[5]。

这种纯解剖学的定义其实并不全面,鉴于解剖学和临床症状的可变性,将来进一步基于形态学特征(血管解剖、直径)和临床神经

表1 共识推荐分级及其意义

Table 1 Consensus recommendation level and its meaning

推荐分级	意义
I级(一致推荐)	100%的专家投票 ≥ 4 分
II级(强推荐)	75%~99%的专家投票 ≥ 4 分,且平均分 > 4 分
III级(弱推荐)	$\geq 50\%$ 的专家投票 ≥ 4 分,但不能满足II级推荐中的任一条件
IV级(专家未达成一致结论)	$< 50\%$ 的专家投票 ≥ 4 分

功能缺损(与血管闭塞对应的症状)的多维定义可能优于单纯的解剖学定义^[6]。例如,在上述定义中,对MCA M2段闭塞的争议较大,如果是MCA M2段优势干闭塞,其血管直径及对应的临床表现与MCA M1段闭塞非常相似;相反,如果是MCA M2段非优势干闭塞,其血管直径及对应的临床表现则与MCA M3段闭塞相似^[7]。因此,2020年Goyal等^[6]建议,对MeVO的定义应在解剖学和血管直径(MCA M2/M3/M4段, ACA A2/A3/A4段和PCA P2/P3/P4段,且直径为1~3 mm)的基础上,补充对血管闭塞导致神经功能缺损的界定,即NIHSS评分 ≥ 5 分和(或)NIHSS评分 ≤ 4 分的致残性卒中(如严重的失语、严重的偏盲等)。即除了要考虑影像诊断的MeVO,对远端中等血管供血区域的功能,以及血管闭塞所致神经功能缺损的评价对做出是否采取血管内治疗的决策也至关重要^[8]。

目前正在进行的MeVO相关随机对照试验如血管内治疗提高MeVO预后(endovascular treatment to improve outcomes for medium vessel occlusions, ESCAPE-MeVO, 注册号: NCT05151172)研究、血管内治疗联合最佳内科治疗对比最佳内科治疗MeVO卒中(endovascular therapy plus best medical treatment versus best medical treatment alone for medium vessel occlusion stroke, DISTAL, 注册号: NCT05029414)研究、评估血管内取栓治疗远端动脉闭塞AIS(evaluation of mechanical

thrombectomy in acute ischemic stroke related to a distal arterial occlusion, DISCOUNT, 注册号: NCT05030142) 研究、可调节小轮廓支架治疗远端缺血性卒中 (distal ischemic stroke treatment with adjustable low-profile stentriever, DISTALS, 注册号: NCT05152524) 研究、评估血管内治疗急性颅内MeVO卒中 (evaluation of endovascular treatment in acute intracranial distal medium vessel occlusion stroke, ORIENTAL-MeVO, 注册号: NCT06146790) 研究以及血管内治疗对比标准内科治疗MeVO的临床预后和安全性随机对照试验 (randomized controlled trial of the clinical outcome and safety of endovascular versus standard medical therapy for stroke with medium sized vessel occlusion, Frontier AP, 注册号: ACTRN12621001746820p) 等, 均对MeVO的解剖特征和闭塞所致神经功能缺损进行了界定。其中ESCAPE-MeVO研究中MeVO的定义为MCA M2/M3段、ACA A2/A3段、PCA P2/P3段闭塞合并NIHSS评分>5分或NIHSS评分3~5分且存在致残性临床症状; DISTAL研究中MeVO的定义为同等优势或非优势的MCA M2段、MCA M3/M4段、ACA A1/A2/A3段或PCA P1/P2/P3段闭塞合并NIHSS评分 \geq 4分或合并致残性临床症状; DISCOUNT研究中MeVO的定义为MCA远端M2/M3段、PCA P1/P2/P3段、ACA A1/A2/A3段合并NIHSS评分 \geq 5分; DISTALS研究中MeVO的定义为ACA、MCA M2/M3段或PCA合并远端血管直径 \geq 1.5 mm, NIHSS评分4~24分或NIHSS评分2~24分且存在失语和(或)偏盲; ORIENTAL-MeVO研究中MeVO的定义为ACA、MCA M2段(直径 \leq 2.5 mm)、MCA M3段、PCA合并NIHSS评分>5分或NIHSS评分3~5分且存在失语、

偏盲或偏瘫/单侧肢体功能丧失等致残症状; Frontier AP中MeVO的定义为MCA M2段(近、中和远)/M3段, ACA A1段, 或A2段伴NIHSS评分 \geq 5分或NIHSS评分<5分合并失语。

推荐意见

MeVO的定义应综合考虑解剖节段、血管直径和临床症状(Ⅱ级推荐):

①具体血管包括MCA M2~M4段、ACA A1~A4段、PCA P1~P4段、AICA、PICA和SCA, 且血管直径为0.75~2 mm。

②临床症状: NIHSS评分>5分或NIHSS评分3~5分伴有严重失语、偏盲或偏瘫/单侧肢体功能丧失等致残性临床症状。

3 中等血管闭塞的发生率及预后

基于既往LVO性卒中相关研究的亚组分析发现, MeVO在AIS中占25%~40%^[5, 9-14]。MeVO可以是原发于中等血管的闭塞(常见原因为动脉粥样硬化), 也可以是继发于LVO血管内治疗导致的远端栓塞, 后者约占临床相关病例的14%^[15-17]。

继发性MeVO占有所有MeVO的20%~40%, 按照发生时不同可分为自发性继发MeVO和治疗后继发MeVO。其中自发性继发MeVO是在没有任何干预和治疗的情况下, 血栓破碎并迁移到MeVO, 可发生于14%的LVO患者; 治疗后继发MeVO可发生在静脉溶栓或血管内治疗之后。按照血栓栓塞流域不同, 继发性MeVO可分为两种情况: 一种是继发性新的流域栓塞, 主要结果是导致新部位的脑组织缺血; 另一种是继发性远端血管栓塞, 主要导致再灌注不良^[16]。前者常见于治疗MCA时导致的ACA栓塞, 后者常见于治疗颈内动脉末端闭塞时导致的MCA及其分支和(或)ACA及其分支栓塞^[5]。

2023年, Liu等^[18]报道了一项2018年1月1日—2020年12月31日基于美国奥姆斯特德县



居民的MeVO发生率调查,其中MeVO的定义为MCA M2段、ACA A2段、PCA P1段及小脑动脉闭塞。该研究共筛选了1718例AIS患者,有77例患者符合MeVO,按奥姆斯特德县人口计算MeVO的年发生率为16/10万(95%CI 12/10万~19/10万)。依此推算,美国每年新发MeVO患者多达52 236例(95%CI 40 635~64 002例)。

尽管人们通常认为MeVO的临床预后好于LVO,但研究提示,MeVO的预后并非想象得那样乐观。

Smith等^[11]的多中心、前瞻性、观察性研究——筛选技术和预后项目(screening technology and outcome project, STOP)发现,不同部位MeVO发病时的平均NIHSS评分分别为:MCA M2段11.5分,ACA A1段8.5分、A2段12.4分,PCA P1段16.3分、P2段10.4分。其中MCA M2段闭塞患者发病6个月时mRS评分3~6分的比例高达60%,病死率为24%;近端ACA/PCA闭塞患者6个月时mRS评分3~6分的比例高达77%,病死率为8%。研究结果提示MeVO患者的预后并不乐观。

2014年,Lima等^[19]报道了一项基于CTA判断前循环不同部位血管闭塞患者临床预后的研究。该研究共纳入126例AIS患者,其中MCA M2段闭塞者48例(38.1%),患者的基线中位NIHSS评分为7(7~15)分,180 d mRS评分≤2分的患者比例仅为54.2%,180 d时病死率为20.8%。在入组患者中,如果基线NIHSS评分≥10分,则预后更差,其180 d时mRS评分≤2分的患者比例仅有22.7%,180 d时病死率高达40.9%。研究结果提示,MCA M2段闭塞患者的临床预后欠佳。

2015年,Sheth等^[20]报道了单中心MCA M2段与MCA闭塞患者临床预后研究的结果,发现M2段闭塞的患者不但入院时中位NIHSS评分与MCA闭塞患者的差异无统计学意义(11分 vs. 16分, $P=0.1$),而且出院时mRS评分4~6分的患者比例与MCA闭塞患者的差异也

没有达到统计学意义(64% vs. 49%, $P=0.13$)。研究结果提示,MCA M2段闭塞与MCA闭塞的临床结局同样较差。

2018年,Rai等^[10]分析了单中心116例MCA M2段闭塞患者的临床预后,发现患者入院时的中位NIHSS评分为12(5~18)分,90 d时mRS评分≤2分的患者比例仅为43%,病死率高达27%,其中NIHSS评分≥9分的患者预后更差,90 d时mRS评分≤2分的比例和病死率分别为22.6%和42.0%。患者的预后与入院时NIHSS评分≥9分以及是否接受血管内治疗相关。研究结果提示,MCA M2段闭塞的患者往往预后不良,血管内治疗可以改善患者的预后。

2020年,Ospel等^[3]报道了未静脉溶栓的MeVO患者预后情况:血管再通率为21.4%,90 d时mRS评分≤2分的患者比例也仅为65.3%;即使进行了最佳药物治疗(如静脉溶栓),90 d时mRS评分≤1分的患者比例仅为25%,mRS评分≤2分的患者比例也仅为50%左右。

与原发性MeVO相比,继发性MeVO患者的结局更差。首先,继发性MeVO是继发于LVO,常合并更大的梗死灶以及更为严重的临床症状,且更易出现梗死后出血转化;其次,LVO的破碎斑块易导致多个远端血管栓塞,造成多发MeVO,治疗难度更大,发生并发症的风险也更高;再次,继发性MeVO常继发于LVO血管内治疗,术者易忽略MeVO的发生,没有及时采取积极的治疗措施^[16]。

4 中等血管闭塞的诊断

目前常规的影像评估手段如MRA和CTA对诊断LVO有较好的敏感性和特异性,但在最初的CTA检查中却有多达82.4%的MeVO被漏诊,这是动脉直径的减小和分支解剖结构的多样性所致,更多远端的分支可能会因为空间分辨率的降低而被混淆^[21]。因此,确定远端血管信号的丢失应该归因于血管闭塞还是解剖差异

相对困难。新型的CTA和MRA技术(如小波CTA和7 T MRA)可能会克服这些限制,但目前新技术的应用范围有限^[22-24]。CTP可以作为可靠的MeVO辅助成像工具,其上显示楔形区域低灌注提示相应血管闭塞,这些血管通常为远端ACA、MCA或PCA^[25-27]。

2021年, Duvekot等^[28]报道了一项多中心、前瞻性、观察性队列研究,以核心影像实验室判读的结果为诊断的金标准,比较日常临床工作中医师应用CTA诊断LVO和MeVO的准确性。该研究纳入了656例患者,核心影像实验室在155例患者中检测到89例LVO和74例MeVO,日常临床医师漏诊了6例(7%)LVO和28例(38%)MeVO,其中MCA M2段闭塞者23例。常规CTA检测LVO的准确度为99%(95%CI 98%~100%),敏感度为93%(95%CI 86%~97%),特异度为100%(95%CI 99%~100%),而检测LVO+MeVO的准确度为95%(95%CI 93%~96%),敏感度为79%(95%CI 72%~85%),特异度为99%(95%CI 98%~100%)。研究结果提示,单独应用CTA在日常诊治中可较好地诊断LVO,但诊断MeVO则存在一定的漏诊问题,应进一步改进MeVO的诊断方法。

相比普通CTA,多时相CTA对MeVO有更高的诊断敏感性。多时相CTA可以快速确定侧支血流,并评估梗死的发展速度,相关血管供血区域下游常可见造影剂延迟^[29]。CTA结合 T_{max} 可以改善MeVO的诊断,将检出率从单独CTA诊断的70.7%提高到90.4%($P<0.001$)^[30]。Alotaibi等^[31]也发现CTA联合CTP可将单独CTA诊断MeVO的检出率从51.6%提高到77.0%。

2021年, Amukotuwa等^[25]比较了单独CTA与 T_{max} (RAPID, iSchema View, Menlo Park, CA)对MeVO的诊断价值,发现区域 T_{max} 延迟诊断MeVO的敏感度为100%(95%CI 94.9%~100%),特异度为87.8%

(95%CI 83.6%~91.3%), ROC的AUC为0.939(95%CI 0.920~0.957)。4名不同经验的医师使用该方法判断MeVO的敏感度 $>95%$,特异度 $>84%$,诊断的准确性和速度显著高于CTA($P<0.001$)。研究结果提示,局部 T_{max} 延迟对诊断MeVO具有良好的敏感性和特异性,即使是没有诊断经验的医师也能准确、快速地解释 T_{max} 的结果,且能较易识别和排除误报的原因,因此推荐使用 T_{max} 来识别MeVO患者。

在目前已发表的观察性研究中,MeVO的影像学诊断方案存在异质性,这需要更多探索以支持建立严格和具体的影像选择标准。有研究认为,对怀疑MeVO的患者,直接至导管室行脑血管造影是一种更可靠的方案,该方案对救治时间和预后的影响均优于常规影像筛查,且可能会提高诊断的准确性^[32-33]。

推荐意见

①与LVO的诊断不同,单独应用CTA诊断MeVO有较高的漏诊率,血管内治疗术前应用多模式CTA及结合人工智能自动CTP中低灌注分布区域的方法可降低MeVO的漏诊率(I级推荐)。

②脑血管造影仍是诊断MeVO的“金标准”,如中心条件允许,对存在低灌注的可疑MeVO患者可直接行脑血管造影进行诊断(I级推荐)。

5 中等血管闭塞的静脉/动脉溶栓治疗

MeVO的闭塞部位较远,血栓负荷通常较小,因此静脉溶栓治疗可能是安全、经济的治疗方法。

2016年,一项纳入26项研究、2063例患者的meta分析表明,单纯静脉溶栓后MCA M2/M3段部分或完全再通率达52%,M1段为35%,而颈内动脉及基底动脉仅为13%。研究结果提示单纯静脉溶栓对MeVO的血管再通效果优于LVO^[34]。2018年,通过CTA寻找新的方法来优化血栓表征以预测静脉注射阿替普酶和其他治疗的早期再通和再灌注



(identifying new approaches to optimize thrombus characterization for predicting early recanalization and reperfusion with IV alteplase and other treatments using serial CTA, INTERReSeCT) 研究也发现, 静脉溶栓后, MCA M3段/ACA/PCA有37.8%的再通率, MCA M2段的再通率为28.8%, 而近端M1段和颈内动脉的再通率仅为17.2%和9.6%。该研究同样提示, 与LVO相比, 单纯静脉溶栓对MeVO有更高的血管再通率^[35]。

2020年, Ospel等^[3]报道了一项MeVO静脉rt-PA溶栓的研究结果, 该研究共纳入MeVO (MCA M2/M3段、ACA A2/A3段、PCA P2/P3段闭塞) 患者256例, 其中186例患者接受了静脉rt-PA治疗, 结果发现接受静脉rt-PA治疗的患者血管早期再通率明显高于未溶栓治疗的患者 (47.2% vs. 21.4%, $P=0.003$), 且早期血管再通与患者获得良好神经功能预后密切相关。研究结果提示, 对于MeVO患者, 尽管静脉rt-PA治疗较不溶栓有更高的血管再通率, 但是血管再通的比例仍不到50%。

尽管静脉溶栓对MeVO有较LVO更高的血管再通率, 但也仅有1/4~1/2的患者能通过单纯的静脉溶栓获得血管再通, 尤其是在血栓负荷较大时, 血管再通的效果并不令人满意^[36]。

目前关于MeVO动脉溶栓的报道较少。最早的MeVO动脉溶栓研究是1999年的尿激酶原治疗急性脑血栓栓塞II (prolyse in acute cerebral thromboembolism II, PROACT II) 研究^[37]。该研究纳入的主要是MCA M1/M2段闭塞患者 (其中M2段闭塞者44例), 使用尿激酶原动脉溶栓后血管部分或完全再通的比例明显高于对照组 (54% vs. 17%), 且90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例有增高趋势 (52% vs. 29%)。

推荐意见

① 时间窗内静脉溶栓是AIS治疗的基础, 发病时间窗内的MeVO患者应积极接受静脉溶

栓治疗 (I级推荐)。

② 即使接受了静脉溶栓治疗, MeVO的血管再通率仍然不高, 尤其是在血栓负荷较大时, 因此, 对于接受了静脉溶栓治疗的MeVO患者, 应严密观察其神经功能缺损的变化, 做好进一步血管内治疗的准备 (I级推荐)。

③ 动脉溶栓治疗MeVO所致AIS的有效性和安全性尚待进一步研究 (III级推荐)。

6 中等血管闭塞的血管内治疗

6.1 中等血管闭塞血管内治疗与最佳药物治疗比较

2016年, Sarraj等^[38]报道了一项多中心回顾性队列研究, 比较了最佳药物治疗与血管内治疗MCA M2段闭塞的有效性 & 安全性。研究共纳入了美国10个中心的522例患者, 其中最佳药物治疗组234例, 血管内治疗组288例。基线指标中, 最佳药物治疗组的中位年龄较高 (73岁 vs. 68岁, $P=0.003$), 静脉溶栓的比例较高 (74.4% vs. 59.7%, $P<0.001$)。研究结果发现, 血管内治疗组中90 d mRS评分 ≤ 2 分的患者比例高于最佳药物治疗组 (65.8% vs. 35.4%); 在校正了年龄、基线NIHSS评分、ASPECTS、静脉溶栓以及最后看起来正常到就诊时间后, 血管内治疗患者获得90 d良好预后的比例是最佳药物治疗患者的3倍 ($OR 3.2$, 95% $CI 2.0\sim 5.2$, $P<0.001$)。两组的症状性颅内出血 (symptomatic intracranial hemorrhage, sICH) 发生率差异不具有统计学意义 (5.6% vs. 2.1%, $P=0.10$)。研究结果提示, 与最佳药物治疗相比, 血管内治疗MCA M2段闭塞具有更好的疗效以及相似的安全性。

2017年, Qureshi等^[39]报道了一项单中心血管内治疗与静脉溶栓治疗MCA M2段闭塞的随机对照试验。研究共纳入51例患者, 血管内治疗组较静脉溶栓组90 d mRS评分 ≤ 1 分的患者比例有更高的趋势, 但差异未达到统

计学意义 (38.2% vs. 17.6%, 未校正OR 2.9, 95%CI 0.7~12.1, $P=0.15$); 两组的sICH发生率差异不具有统计学意义 (5.9% vs. 11.8%, $P=0.47$); 在3个月病死率[校正OR (adjusted OR, aOR) 0.1, 95%CI 0.1~0.8, $P=0.031$]和9个月病死率 (aOR 0.1, 95%CI 0.1~0.7, $P=0.022$) 方面, 血管内治疗组均显著低于静脉溶栓组。研究结果提示, 对于MCA M2段闭塞, 血管内治疗可明显降低患者的病死率, 且有使更多患者获得功能独立的趋势。

2019年发表的多项血管内治疗卒中试验再灌注高效评价 (highly effective reperfusion evaluated in multiple endovascular stroke trials, HERMES) 研究对2015年发表的7项大型随机对照试验中的130例MCA M2段闭塞患者的血管内治疗效果进行了汇总分析^[7]。数据分析显示, 有59%的MCA M2段闭塞患者经血管内治疗后mTICI \geq 2b级; 与药物治疗组相比, 血管内治疗组90 d mRS评分 \leq 2分的患者比例增高 (58% vs. 40%, $P=0.03$); 血管内治疗组sICH的发生率为0, 而药物治疗组为7.9%。研究结果提示, MCA M2段闭塞患者是可以通过血管内治疗明显获益的, 而且安全性较高。

2021年, Meyer等^[40]报道了一项国际多中心病例对照研究, 对比了PCA P2/P3段闭塞患者血管内治疗与最佳药物治疗的有效性 & 安全性。研究通过倾向评分匹配纳入184例患者, 出院时血管内治疗组与最佳药物治疗组NIHSS评分减分率的差异不具有统计学意义; 亚组分析发现, 入院时NIHSS评分 \geq 10分与NIHSS评分 \leq 9分亚组人群的入院到出院平均NIHSS评分减分差异有统计学意义 ($MD -5.6$ 分, 95%CI $-10.9 \sim -0.2$ 分, $P=0.04$)。该研究结果提示, 在PCA P2/P3段闭塞患者人群中, 与最佳药物治疗 (有或没有静脉溶栓) 相比, 血管内治疗是一种安全且技术上可行的有效治疗选择。

2021年, Wang等^[41]发表了比较M2段

闭塞接受血管内治疗与最佳药物治疗的meta分析, 共纳入4项研究中的1016例患者, 分析发现, 血管内治疗M2段闭塞较最佳药物治疗具有更高的90 d mRS评分 \leq 2分患者比例 ($RR 1.43$, 95%CI $1.08 \sim 1.90$, $P=0.011$), 两种治疗的sICH发生率相似 ($RR 1.65$, 95%CI $0.66 \sim 4.13$, $P=0.286$), 但是血管内治疗增加了患者的死亡风险 ($RR 0.46$, 95%CI $0.22 \sim 0.96$, $P=0.022$)。研究结果证明, 血管内治疗MCA M2段闭塞有效且相对安全。

2022年Saber等^[42]报道了一项多中心回顾性研究 (2015年1月—2019年12月), 比较了血管内治疗与最佳药物治疗对MeVO (ACA与MCA区域) 的效果。研究共纳入286例患者, 其中血管内治疗组156例, 最佳药物治疗组130例, 血管内治疗组的基线NIHSS评分高于最佳药物治疗组 (13.9分 vs. 9.4分, $P<0.001$), 两组90 d mRS评分 \leq 2分的患者比例 (51.7% vs. 50.0%, $P=0.78$)、90 d mRS评分 \leq 1分的患者比例 (38.4% vs. 31.7%, $P=0.25$) 以及90 d病死率 (18.7% vs. 11.3%, $P=0.15$) 差异均无统计学意义; 在逆概率处理加权倾向分析后, 两组90 d mRS评分 \leq 2分的患者比例差异无统计学意义 (aOR 1.36, 95%CI 0.84~2.19, $P=0.20$), 但mRS评分 \leq 1分的患者比例差异具有统计学意义 (aOR 1.71, 95%CI 1.02~2.87, $P=0.04$)。研究结果提示血管内治疗可以作为MeVO的治疗选择。

2022年, Marchal等^[43]报道了一项来自法国的多中心登记研究, 比较了血管内治疗与最佳药物治疗前循环MeVO的效果。研究在2017年1月—2019年12月共纳入171例患者, 其中96例接受了血管内治疗, 75例接受了最佳药物治疗。研究结果发现, 血管内治疗组出院时NIHSS评分减分优于最佳药物治疗组 (aOR 3.71, 95%CI 1.18~6.24, $P=0.004$), 血管内治疗与早期神经功能改善相关 (aOR 3.71,

95%CI 1.18~6.24, $P=0.004$) ; 亚组分析发现, MCA M2段闭塞患者中, 血管内治疗组出院时NIHSS评分减分优于最佳药物治疗组 (aOR 5.23, 95%CI 2.18~8.29, $P=0.001$), 血管内治疗与患者早期神经功能改善相关 (aOR 3.62, 95%CI 1.31~10.03, $P=0.013$), 另外, 两组的sICH发生率差异不具有统计学意义。研究结果提示, 对于MeVO患者, 尤其是MCA M2段闭塞的MeVO患者, 血管内治疗较最佳药物治疗安全且有效。

2023年, Meyer等^[44]报道了血管内治疗与最佳药物治疗MeVO (ACA A2/A3段) 国际多中心回顾性注册研究。研究共纳入154例患者, 其中94例患者接受了血管内治疗, 60例患者接受最佳药物治疗。倾向匹配分析发现, 血管内治疗组24 h内NIHSS评分下降的中位数为2分, 最佳药物治疗组为1分, 但组间差异未达统计学意义 ($P=0.52$) ; 两组90 d mRS评分 ≤ 2 分的患者比例 (49% vs. 49%, $P=0.99$) 和90 d病死率 ($P=0.36$) 差异也没有达到统计学意义。研究结果提示, 血管内治疗ACA A2/A3段MeVO在技术上可行且安全。

2023年, Loh^[45]对血管内治疗MeVO进行了系统回顾及meta分析, 纳入了14项观察性研究和2项随机对照试验, 共1202例患者, 发现血管内治疗较最佳药物治疗有更高的90 d mRS评分 ≤ 2 分患者比例 (aOR 1.61, 95%CI 1.06~2.43), 但90 d mRS评分 ≤ 1 分的患者比例 (OR 1.23, 95%CI 0.88~1.71)、sICH发生率 (OR 1.44, 95%CI 0.78~2.66) 以及90 d病死率 (OR 1.03, 95%CI 0.73~1.45) 与最佳药物治疗相比差异无统计学意义。进一步的分层分析发现, 血管内治疗单独或联合动脉溶栓较最佳药物治疗能获得更高的90 d mRS评分 ≤ 1 分的患者比例 (OR 1.59, 95%CI 1.13~2.23), 但是在基线NIHSS评分 ≤ 5 分的患者人群中, 血管内治疗较最佳药物治疗有更高的sICH风险 (OR 6.30,

95%CI 1.55~25.64)。研究结果证明血管内治疗MeVO较最佳药物治疗有更好的疗效及相似的安全性。

综上所述, 对于MeVO患者, 与最佳药物治疗相比, 血管内治疗具有相似的安全性和更高的血管开通率, 并可能带来更好的临床预后, 但仍需高质量的临床研究进一步证实。

6.2 MeVO与LVO的血管内治疗比较

2019年, Kim等^[46]进行了血管内治疗MCA闭塞的meta分析, 共纳入8项研究、650例患者。研究结果发现, 血管内治疗MCA M2段闭塞的成功再灌注 (mTICI ≥ 2 b级) 率为69.1%, sICH发生率为6.1%, 90 d mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为59.4%; 与MCA M1段闭塞相比, M2段闭塞血管内治疗后有相似的血管再通率 (OR 1.539, 95%CI 0.293~8.092, $P=0.610$) 和sICH发生率 (OR 1.313, 95%CI 0.603~2.861, $P=0.493$), 但有更高的90 d mRS评分 ≤ 2 分的患者比例 (OR 1.639, 95%CI 1.135~2.368, $P=0.008$)。研究结果提示血管内治疗MCA M2段闭塞是安全、有效的。

2020年, 日本的Nakano等^[47]的多中心观察性研究比较了血管内治疗对MCA M1段与M2段闭塞的有效性及其安全性, 纳入了M1段闭塞患者160例, M2段闭塞患者51例。研究结果发现, M2段闭塞组穿刺到成功血管再通时间较M1段闭塞组长[60 min (38~79 min) vs. 43 min (30~61 min), $P=0.01$], 两组的sICH发生率 (2.0% vs. 2.5%, $P=1.0$)、血管成功再通率 (80.4% vs. 84.4%, $P=0.52$) 以及90 d mRS评分 ≤ 2 分的患者比例 (51.0% vs. 48.8%, $P=0.872$) 差异均无统计学意义。研究结果提示, 血管内治疗MCA M1段闭塞与M2段闭塞有相似的疗效及安全性, 但M2段的手术时间可能更长。

2021年, Jumaa等^[48]报道了一项比较MCA M1段 (538例) 与M2段 (170例) 闭塞血管内治疗有效性和安全性的多中心、前瞻性、观察性研究。研究结果发现, M1段闭塞组的基

线NIHSS评分高于M2段闭塞组[(17.3±5.5)分 vs. (15.7±5.0)分, $P<0.001$], 两组的穿刺到成功血管再通时间[(46.0±27.8) min vs. (45.1±29.5) min, $P=0.75$]、血管完全再通(mTICI≥2b级)率(91% vs. 95%, $P=0.09$)和90 d mRS评分≤2分的患者比例(58% vs. 59%, $P=0.83$)差异均无统计学意义, 但M2段闭塞组术后24 h内sICH发生率显著高于M1段闭塞组(4% vs. 1%, $P=0.01$)。研究结果提示, 血管内治疗MCA M2段闭塞尽管有较高的sICH发生率, 但是成功再灌注及90 d良好预后的比例与血管内治疗M1段闭塞是相似的。

2022年Shek等^[49]通过单中心回顾性队列研究比较了血管内治疗前循环MeVO与LVO的有效性和安全性。研究共纳入MeVO患者43例, LVO患者199例, 数据分析发现, 两组90 d时mRS评分≤2分的患者比例(32.9% vs. 27%)及颅内出血发生率(44.9% vs. 37.2%)差异均无统计学意义。研究结果提示, 与LVO相比, MeVO患者接受血管内治疗具有相似的疗效及安全性。

2022年, Sun等^[50]报道的一项中国的多中心回顾性队列研究也比较了血管内治疗前循环MeVO与LVO的有效性和安全性。研究共纳入MeVO患者147例, 同期LVO患者885例, 数据分析发现, 两组接受血管内治疗后90 d mRS评分≤2分的患者比例(42.9% vs. 40.6%, $P=0.601$)差异无统计学意义, sICH的发生率(4.8% vs. 8.9%, $P=0.098$)和90 d病死率(11.6% vs. 14.5%, $P=0.77$)差异也无统计学意义, 提示MeVO与LVO患者接受血管内治疗的有效性和安全性相似。

2022年, Grossberg等^[51]报道的血管内治疗LVO与MeVO国际多中心回顾性研究共纳入5997例LVO和1287例MeVO患者, 分析发现, MeVO不是患者90 d预后不良的预测因子($P=0.55$), 但与LVO患者相比, MeVO患者血管内治疗后颅内出血的发生率更高(9% vs. 4%,

$P<0.01$), 手术时间更长(51 min vs. 33 min, $P<0.01$)。研究结果提示, 血管内治疗MeVO与LVO具有相似的临床预后, 但MeVO的手术时间更长, 且具有较高的颅内出血发生率。

2022年, Herzberg等^[52]报道了德国卒中登记数据库中血管内治疗MCA M1段与M2段闭塞的有效性和安全性结果。研究者共分析了2689例M1段闭塞患者和1115例M2段闭塞患者的数据。基线资料方面: M1段闭塞组的NIHSS评分高于M2段闭塞组[15 (10~18)分 vs. 11 (6~16)分, $P<0.001$], ASPECTS低于M2段闭塞组[9 (7~10)分 vs. 9 (8~10)分, $P<0.001$]。终点结局方面: 两组的sICH、蛛网膜下腔出血(subarachnoid hemorrhage, SAH)和手术不良反应发生率等差异均未达统计学意义; 术后24 h时NIHSS评分减分≥4分的患者比例(62.5% vs. 61.4%, $P=0.57$)和90 d时病死率(26.9% vs. 22.9%, $P=0.23$)的差异也无统计学意义; M2段闭塞组90 d时mRS评分≤2分的患者比例高于M1段闭塞组(46.5% vs. 38.9%, $P<0.001$)。研究结果提示, 对于MCA M2段闭塞, 血管内治疗的安全性与M1段闭塞相似, 且临床预后更佳。

2023年, Schulze-Zachau等^[53]在25个中心通过回顾性队列研究比较了血管内治疗LVO与MeVO血管穿孔的发生率。研究在2015年1月—2022年9月共纳入25 769例患者, 其中LVO组20 645例(80.1%)、MeVO组5124例(19.9%), MeVO组的术前NIHSS评分低于LVO组[(13.2±6.3)分 vs. (14.8±7.3)分, $P=0.049$], 血管穿孔发生率高于LVO组(2.4% vs. 1.0%, $P<0.001$), 尽管如此, MeVO血管穿孔患者90 d mRS评分≤2分的比例却高于LVO血管穿孔患者(25.7% vs. 10.9%, $P=0.001$)。血管穿孔主要发生在器械通过闭塞部位和支架/吸栓导管回撤这两个步骤。研究结果提示, 血管内治疗MeVO较LVO有更高的血管穿孔风险, 手术过程中, 器械通过



闭塞部位和回撤取栓器械时应警惕血管穿孔的发生。

2024年, Cascio Rizzo等^[54]报道了一项单中心血管内治疗MeVO的结果, 共纳入114例患者(占该中心同期接受血管内治疗患者的33.4%)。与LVO相比, 血管内治疗原发性MeVO并发症的发生率较高(aOR 3.77, 95% CI 1.58~9.00, $P=0.003$), 血管开通($eTICI\geq 2b$ 级)率(aOR 0.32, 95% CI 0.12~0.88, $P=0.027$)和90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例(aOR 0.28, 95% CI 0.13~0.63, $P=0.002$)较低。对于继发性MeVO患者, 血管内治疗的疗效和安全性与LVO患者相比差异无统计学意义。相比原发性MeVO, 继发性MeVO血管内治疗90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例较高(aOR 8.00, 95% CI 2.12~30.17, $P=0.002$)。研究结果提示, 血管内治疗原发性MeVO和继发性MeVO的有效性和安全性有所差异。

综上所述, 虽然血管内治疗原发性MeVO和继发性MeVO的有效性和安全性可能有所不同, 但与LVO相比, 血管内治疗对MeVO具有相似的疗效和安全性。对MeVO患者进行血管内治疗时, 应警惕取栓时器械对远端小血管的牵拉, 谨慎操作, 以避免血管穿孔的发生。

6.3 MeVO血管内治疗研究现状

2016年, Coutinho等^[55]对Solitaire装置取栓用于急性血管闭塞再通(Solitaire flow restoration thrombectomy for acute revascularization, STAR)研究、Solitaire装置与Merci装置治疗AIS(Solitaire flow restoration device versus the Merci retriever in patients with acute ischaemic stroke, SWIFT)研究和SolitaireTM用于血栓切除的血管内治疗试验(SolitaireTM with the intention for thrombectomy as primary endovascular treatment trial, SWIFT PRIME)3项大型多中心前瞻性研究中血管内治

疗MCA M2段闭塞患者的资料进行了事后分析。研究共纳入了50例MCA M2段闭塞患者, 平均基线NIHSS评分为13分, 数据分析发现, 血管内治疗的成功血管再通($mTICI\geq 2b$ 级)率为85%, 90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为60%, sICH发生率为2%。研究结果提示血管内治疗MeVO是安全且有效的。

2017年, Bhogal等^[56]报道了一项血管内治疗MCA M2段闭塞的单中心回顾性研究结果。研究共纳入106例MCA M2段闭塞的患者, 患者术前平均NIHSS评分为11.8分, 血管成功再通($mTICI\geq 2b$ 级)率为90.5%, 90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为54.6%, sICH发生率为4.7%, 90 d病死率为14.1%。研究结果提示, 血管内治疗MCA M2段闭塞是安全、有效的, 对M2段闭塞的患者可以考虑选择血管内治疗。

2017年, Chen等^[57]对血管内治疗MCA M2段闭塞的研究进行了meta分析, 共纳入8项研究中的634例患者, 发现血管内治疗MCA M2段闭塞的成功血管再通($mTICI\geq 2b$ 级)率为78%, 90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为63%, sICH发生率为5%。研究结果提示, 血管内治疗MCA M2段闭塞有较好的安全性, 但由于没有与内科治疗进行对比, 因此血管内治疗能否真正获益尚不明确。

2018年, Saber等^[58]报道了血管内治疗MCA M2段闭塞的meta分析结果, 共纳入了12项研究中的1080例M2段闭塞患者, 研究结果发现成功血管再通($mTICI\geq 2b$ 级)率为81% (95% CI 79%~84%), 90 d时mRS评分 ≤ 2 分患者的比例为59% (95% CI 54%~64%), sICH的发生率为10% (95% CI 6%~16%), 90 d病死率为16% (95% CI 11%~23%)。研究结果显示血管内治疗MCA M2段闭塞是安全有效的。

2019年, Compagne等^[59]基于荷兰AIS血管内治疗多中心随机对照临床试验(multicenter randomized clinical trials of endovascular treatment of acute ischemic stroke in the

Netherlands, MR CLEAN) 数据库, 回顾性分析了血管内治疗MCA M2段闭塞的结果。该研究共纳入224例患者, 患者入院时中位NIHSS评分为14分, 血管内治疗成功再灌注 (mTICI \geq 2b级) 率为57%, sICH发生率为7%, 90 d病死率为22%, 90 d时mRS评分 \leq 2分的患者比例为46%, 上述安全性和有效性结局指标水平与MR CLEAN数据库中MCA M1段闭塞的血管内治疗效果相当。研究结果提示, 血管内治疗MCA M2段闭塞安全、有效, 且其治疗效果与M1段闭塞的血管内治疗效果相当。

2021年, Cappellari等^[60]报道了基于意大利AIS血管内治疗登记数据库的血管内治疗MCA M2段闭塞真实世界回顾性队列研究结果。研究者纳入的患者中, 有156例接受了单纯血管内治疗, 有266例接受了静脉溶栓桥接血管内治疗, 有43例接受了血管内治疗+动脉溶栓。研究结果发现, 相比单纯血管内治疗, 血管内治疗+动脉溶栓与更高的成功血管再通 (TICI 2b/3级) 率 (OR 3.281, 95% CI 1.006~10.704) 以及更高的90 d时mRS评分 \leq 1分 (OR 4.153, 95% CI 1.267~13.612) 和 \leq 2分 (OR 4.497, 95% CI 1.485~13.617) 的患者比例相关; 单独动脉溶栓治疗与成功血管再通率低相关 (OR 0.369, 95% CI 0.144~0.948); 静脉溶栓桥接血管内治疗与无症状颅内出血发生率高相关 (OR 2.526, 95% CI 1.145~5.571); 3种治疗方法的sICH发生率和90 d病死率差异无统计学意义。研究结果提示, 对于MCA M2段闭塞患者, 血管内治疗+动脉溶栓治疗优于单独的血管内治疗。

2022年, Wang等^[61]的研究分析了单中心血管内治疗MeVO的有效性与安全性 (2018年1月—2021年1月)。该研究共纳入61例患者, 血管内治疗后出现早期神经功能改善 (定义为手术后NIHSS评分减分 \geq 8分或NIHSS评分 \leq 2分) 的患者比例达39%, 而且早期神经功能改善的患者90 d时mRS评分 \leq 2分的比例显著高于

没有早期神经功能改善的患者 (83% vs. 43%, $P=0.019$); 早期神经功能改善 (OR 12.49, 95% CI 1.49~105.01, $P=0.020$) 和静脉溶栓 (OR 6.59, 95% CI 1.82~23.89, $P=0.004$) 是获得良好预后的独立预测因子。研究结果证明血管内治疗MeVO有效。

2022年, Meyer等^[62]对一项国际多中心注册研究的数据进行了回顾性分析, 探索血管内治疗后循环MeVO的安全性和可行性。研究者共纳入71例PCA P2/P3段闭塞的患者, 其中P2段闭塞占80.3%, P3段闭塞占19.7%。第一次取栓后, 有38%的患者达到TICI 3级, 90 d内sICH的发生率为2.8%, 90 d时mRS评分 \leq 2分的患者比例达44.8%。研究结果提示, 对后循环MeVO患者进行血管内治疗是安全、可行的。

2022年, Muszynski等^[63]分析了法国多中心AIS血管内治疗登记数据库 (endovascular treatment in ischemic stroke, ETIS) 中MCA M2段闭塞患者的治疗效果。研究共纳入了458例患者, 中位NIHSS评分为14分, 治疗后成功再灌注定义为TICI增加 \geq 1级。该研究中sICH的发生率为9.3%, 90 d时达到mRS评分 \leq 1分的患者比例为51.9%, 90 d病死率为19.6%。进一步分析提示, 治疗后成功再灌注可增加患者达到mRS评分 \leq 2分 (OR 2.79, 95% CI 1.31~5.93, $P=0.007$) 的机会, 同时降低90 d内死亡的风险 (OR 0.39, 95% CI 0.19~0.79, $P<0.01$)。研究结果提示, 血管内治疗MCA M2段闭塞是安全、有效的, 成功再灌注与提高患者的良好预后率, 降低病死率相关。

2023年, Alawieh等^[64]报道了一项国际多中心血管内治疗MeVO的回顾性研究结果。该研究共纳入接受血管内治疗的7447例患者, 其中远端MeVO (MCA M3/M4段、ACA A2/A3段、PCA P2/P3段) 213例。研究结果提示, MeVO不是患者90 d时mRS评分 \leq 2分的预测因子 ($P=0.467$), MeVO成功血管再

通是90 d时mRS评分 ≤ 2 分的独立预测因子 (aOR 5.11, $P < 0.05$), 低龄、接受桥接治疗及入院时NIHSS评分低也是90 d时mRS评分 ≤ 2 分的独立预测因子; 手术过程中取栓次数 ≤ 1 次 (aOR 4.5, $P < 0.05$) 或 ≤ 3 次 (aOR 2.3, $P < 0.05$) 是患者90 d时mRS评分 ≤ 2 分的预测因子; 抽取取栓和支架取栓对MeVO的疗效和安全性相似。研究结果提示, 血管内治疗远端MeVO在疗效和安全性上与LVO的差异不具有统计学意义。

2023年, Kniep等^[65]报道了德国卒中取栓登记库中MCA M2段闭塞患者血管内治疗的疗效及其影响因素。在纳入分析的1348例患者中, 成功血管再通 (TICI ≥ 2 b级) 率为84%, 90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为44.1%, 24 h内sICH发生率为3.1%。成功血管再通 (OR 4.27, 95%CI 3.12~5.91, $P < 0.001$)、高ASPECTS (OR 1.25, 95%CI 1.18~1.32, $P < 0.001$)、静脉溶栓 (OR 1.28, 95%CI 1.07~1.54, $P < 0.01$) 可提高患者的90 d良好预后率, 而老年 (OR 0.95, 95%CI 0.94~0.95, $P < 0.001$)、术前mRS评分高 (OR 0.36, 95%CI 0.31~0.40, $P < 0.001$)、基线NIHSS评分高 (OR 0.89, 95%CI 0.88~0.91, $P < 0.001$)、糖尿病 (OR 0.52, 95%CI 0.42~0.64, $P < 0.001$)、取栓次数多 (OR 0.75, 95%CI 0.70~0.80, $P < 0.001$) 以及颅内出血 (OR 0.26, 95%CI 0.14~0.46, $P < 0.001$) 则降低患者90 d良好预后的可能。研究结果提示, 血管内治疗MCA M2段闭塞安全且有效, 治疗时应根据影响患者预后的因素选择适合的患者。

2023年, Winkelmeier等^[66]回顾性分析了德国卒中登记数据库中1078例血管内治疗MCA M2段闭塞患者的资料, 结果显示, 成功血管再通 (TICI ≥ 2 b级) 率为87.1%, 90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为51.9%, 24 h内sICH发生率为3.1%; 取栓次数 ≥ 4 次与患者预后不良及颅内出血相关。研究结果提示, 血管

内治疗MeVO是安全有效的, 尤其是对取栓次数3次以内, 成功血管开通的患者。

2023年, Radu等^[67]报道的国际多中心回顾性研究对血管内治疗MeVO的疗效以及一次性血管再通对患者预后的影响进行了分析。该研究共纳入836例患者, 数据分析发现, 血管内治疗后, MeVO患者90 d时mRS评分 ≤ 2 分的比例为60.0%, sICH发生率为0.9%。研究中有302例患者获得了一次性成功血管再通 (mTICI 3级), 高血压 (aOR 1.55, 95%CI 1.10~2.20) 和低NIHSS评分 (aOR 0.95, 95%CI 0.93~0.97) 与一次性血管再通相关; 一次性成功血管再通组90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例高于非一次性成功血管再通组 (72.8% vs. 52.8%, $P < 0.001$), 同时90 d病死率 (6.6% vs. 15.7%, $P < 0.001$) 和颅内出血发生率 (22.8% vs. 36.5%, $P < 0.001$) 低于非一次性成功血管再通组。一次性成功血管再通与患者获得90 d良好预后独立相关 (aOR 2.20, 95%CI 1.59~3.05)。研究结果提示, 血管内治疗MeVO是安全、有效的, 且一次性成功血管再通与患者获得良好预后独立相关。

2023年, Rodriguez-Calienes等^[68]对血管内治疗MeVO的相关研究进行了meta分析, 共纳入了29项研究, 1262例患者。数据分析显示, 在971例原发性MeVO患者中, 成功血管再通 (TICI ≥ 2 b级) 率为84% (95%CI 76%~90%), 90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为64% (95%CI 54%~72%), 90 d病死率为12% (95%CI 8%~18%), sICH发生率为6% (95%CI 4%~10%); 在291例继发性MeVO患者中, 成功血管再通率为82% (95%CI 73%~88%), 90 d mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为54% (95%CI 39%~69%), 90 d病死率为11% (95%CI 5%~20%), sICH发生率为3% (95%CI 1%~9%)。亚组分析发现, 血管内治疗原发性和继发性MeVO患者的有效性与安全性差异均无统计学意义。研究结果提示血管

内治疗MeVO安全、有效。

2024年, Nome等^[69]基于奥斯陆急性再灌注卒中研究 (Oslo acute reperfusion stroke study, OSCAR) 数据库, 进行了血管内治疗MeVO效果的分析。研究者通过对144例MeVO患者的数据进行分析发现, 血管内治疗后, MeVO患者获得成功血管再通的比例为84.7%, 90 d时达到mRS评分 ≤ 2 分的比例为61.8%, sICH发生率为1.4%, 90 d病死率为17.4%。研究还发现取栓次数 ≥ 2 次与SAH、不良预后及不良灌注相关, 且80岁以上的患者预后较差。研究结果提示, 血管内治疗MeVO是安全、有效的, 治疗中应努力实现一次性血管成功再通。

2024年, Rizzo等^[70]报道了一项单中心的前瞻性观察性研究, 对比了静脉溶栓、单纯血管内治疗与桥接治疗对MeVO的有效性和安全性。该研究共纳入180例患者, 其中静脉溶栓59例, 单纯血管内治疗38例, 桥接治疗83例, 分析发现, 桥接治疗 ($OR\ 2.76, 95\%CI\ 1.08\sim 7.07, P=0.034$)、年龄 ($OR\ 0.94, 95\%CI\ 0.90\sim 0.97, P=0.001$) 和基线NIHSS评分 ($OR\ 0.88, 95\%CI\ 0.81\sim 0.95, P=0.002$) 是患者90 d时mRS评分 ≤ 2 分的独立预测因子。与单纯血管内治疗相比, 桥接治疗可增加20%的血管成功再通机会 (74.4% vs. 56.4%, $P=0.049$)。另外, 患者围治疗期并发症发生率较低 (sICH为1.1%、SAH为1.7%、血管痉挛为4.1%)。研究结果提示, 与静脉溶栓/单纯血管内治疗相比, 桥接治疗可提高MeVO患者获得良好预后的机会。

与LVO类似, 首通效应 (first-pass effect, FPE) 在MeVO中也具有重要的临床意义。MeVO中的FPE定义须同时符合以下3项: ①只使用了单次取栓操作; ②MeVO责任动脉及其下游动脉成功再通 (mTICI 2b、2c和3级); ③未使用补救治疗, 包括动脉内给药、血管成型及进一步的抽吸/支架取栓治疗等。2022年Farouki等^[71]的研究纳入了60例原发性MeVO患者, 其中19例 (32%) 达到了FPE, FPF与更好

的临床预后和更慢的梗死体积增加相关。

综上所述, 既往的回顾性研究显示, 对原发性和继发性MeVO患者进行血管内治疗均可获得与LVO血管内治疗相似的安全性和疗效, 而且桥接治疗可能获得更好的临床结局。与LVO患者类似, FPF对MeVO患者具有重要的临床意义。

7 中等血管闭塞血管内治疗专用材料与技术总结

与LVO不同, MeVO取栓面临的是更远端及迂曲的血管, 血管直径更小, 解剖结构更复杂, 且有更高的血管穿孔、SAH发生率。因此, 在LVO血管内治疗中常规使用的5~6 F (1 F=0.33 mm) 远端通路/抽吸导管可能不适合在MeVO术中使用。另外, 由于目前上市的微导管长度不足等问题, LVO中经常使用的长鞘/球囊导引导管远端通路/抽吸导管+微导管/微导丝的三轴系统在MeVO中可能难以到位, 所以需要MeVO专用的取栓器械和方法以增加MeVO血管内治疗的安全性和有效性。

类似于LVO的手术策略, MeVO的一线手术策略包括: 支架取栓、抽吸取栓以及支架+抽吸的联合取栓术。目前尚无在MeVO患者中对比不同取栓方式的随机对照试验, 但仍有一些高质量研究的亚组分析和大样本队列研究对MeVO的不同术式进行了对比。

7.1 MeVO不同取栓策略的对比

7.1.1 抽吸取栓对比支架取栓

2018年接触式抽吸与可回收支架对成功血管再通 (contact aspiration versus stent retriever for successful revascularization, ASTER) 研究团队报道了MCA M2段闭塞抽吸取栓与支架取栓有效性和安全性的多中心回顾性研究结果^[72]。该研究共纳入79例患者, 接受抽吸取栓治疗者48例, 支架取栓者31例, 分析发现两种治疗方法在成功血管再通 (mTICI ≥ 2 b级) 率 (89.6% vs. 83.9%,



$P=0.36$) 和90 d时mRS评分 ≤ 2 分患者比例 (54.4% vs. 50.0%, $P=0.84$) 方面的差异均无统计学意义, 但抽吸取栓有增加颅内出血风险的趋势 (6.3% vs. 3.2%)。研究结果提示, 对于MCA M2段闭塞患者, 采用支架取栓与接触式抽吸取栓治疗的疗效和安全性是相当的。

2018年, Phan等^[73]报道了MeVO支架取栓与抽吸取栓比较的meta分析, 共纳入12项研究, 835例患者。研究结果发现, 支架取栓和抽吸取栓治疗的成功血管再通 (mTICI $\geq 2b$ 级) 率 (80.5% vs. 86.8%, $P=0.168$)、90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例 (59.9% vs. 74.5%, $P=0.120$)、穿刺到成功血管再通时间 (35.6 min vs. 40.8 min, $P=0.273$)、90 d病死率 (14.7% vs. 4.3%, $P=0.212$) 和sICH发生率 (5.7% vs. 2.6%, $P=0.183$) 差异均无统计学意义; 支架取栓组90 d时mRS评分 ≤ 1 分的患者比例低于抽吸取栓组 (39.9% vs. 65.6%, $P=0.003$)。研究结果提示, 对于MeVO患者, 采用支架取栓与抽吸取栓均安全、有效, 但采用抽吸取栓能获得更高的90 d时mRS评分 ≤ 1 分的患者比例。

2019年, Atchaneeyasakul等^[74]的多中心回顾性队列研究比较了支架取栓与抽吸取栓治疗MCA M2段闭塞的有效性和安全性。该研究共纳入了197例M2段闭塞的患者, 其中采用支架取栓治疗者120例, 采用抽吸取栓治疗者77例。研究结果发现, 支架取栓与抽吸取栓相比有更高的90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例 ($OR 3.2$, 95% $CI 1.02\sim 9.70$) 和更低的sICH发生率 ($OR 0.09$, 95% $CI 0.03\sim 0.31$), 同时支架取栓有更高的成功血管再通率 ($OR 3.8$, 95% $CI 1.5\sim 9.6$)。研究结果提示, 支架取栓较抽吸取栓治疗MCA M2段闭塞有更好的疗效和安全性。

2021年, Bernsen等^[75]对荷兰AIS血管内治疗多中心随机对照临床试验登记 (multicenter randomized clinical trials of endovascular

treatment of acute ischemic stroke in the Netherlands registry, MR CLEAN Registry) 的数据进行了亚组分析, 共纳入了471例MCA M2段闭塞的患者, 其中144例首选抽吸取栓治疗, 327例首选支架取栓治疗。研究结果显示, 在成功血管再通 (eTICI $\geq 2b$ 级) (72% vs. 61%, $P=0.04$) 和FPF (53% vs. 46%, $P=0.03$) 方面, 抽吸取栓均显著优于支架取栓, 另外, 两种治疗方法在sICH发生率 (9% vs. 6%, $P=0.3$) 和90 d死亡率 (29% vs. 22%, $P=0.06$) 方面的差异无统计学意义。

2022年, Meyer等^[76]对取栓治疗原发性远端大脑后动脉闭塞 (thrombectomy for primary distal posterior cerebral artery occlusion stroke, TOPMOST) 研究进行了亚组分析, 比较抽吸取栓与支架取栓对后循环MeVO的疗效和安全性。研究者共纳入141例PCA P2/P3段闭塞的患者, 其中首发采用抽吸取栓治疗者占29%, 采用支架取栓者占71%。抽吸取栓组与支架取栓组的一次成功血管再通率差异无统计学意义 (53.7% vs. 44.0%), 90 d时mRS评分 ≤ 1 分的患者比例差异也未达统计学意义 (60.5% vs. 68.6%)。所有患者的sICH发生率为2.8%。研究结果显示两种血管开通方式对后循环MeVO患者的疗效和安全性相当。

2023年, Toh等^[77]通过meta分析比较了抽吸取栓与支架取栓治疗MeVO的疗效和安全性。该meta分析纳入了12项队列研究和1项随机对照试验, 共1881例患者, 其中1274例患者进行了支架取栓, 607例患者进行了抽吸取栓治疗。研究结果发现, 首发使用支架取栓有更高的90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例 ($OR 1.33$, 95% $CI 1.06\sim 1.67$) 和更低的病死率 ($OR 0.69$, 95% $CI 0.50\sim 0.94$); 在成功血管再通和sICH发生率方面, 两种治疗方法的差异无统计学意义; 分层分析发现, 单独使用支架取栓较单独抽吸取栓有更高的血管再通率 ($OR 1.80$, 95% $CI 1.17\sim 2.78$)。研究结果提示, 初始使用

支架取栓对MeVO有更好的疗效,安全性上与抽吸取栓相当。

2023年, Bilgin等^[78]对一线取栓治疗MeVO的有效性和安全性进行了系统回顾,共纳入了13项研究中的2422例患者。数据分析发现,研究的总体成功血管再通率达77%,支架+抽吸取栓的血管再通率为83.%,单纯支架取栓为75.6%,单纯抽吸取栓为74.2%。患者总体达到90 d时mRS评分 ≤ 2 分的比例为51.3%,其中支架+抽吸取栓为61.7%,单纯支架取栓为51.5%,单纯抽吸取栓为46.9%。在SAH发生率上,支架+抽吸取栓为11.9%,单纯支架取栓为9.3%,单纯抽吸取栓为1.8%。研究结果提示,血管内治疗MeVO是安全且有效的,其中单纯抽吸治疗的SAH发生率较低。

7.1.2 抽吸取栓、支架取栓、联合取栓的对比

2022年, Muszynski等^[63]对ETIS登记研究进行了亚组分析,共纳入458例MCA M2段闭塞的患者,其中213例采用抽吸取栓治疗,49例采用支架取栓治疗,194例进行了联合取栓治疗。结果显示,3组的成功血管再通率和良好功能预后率差异无统计学意义,但支架取栓组和联合取栓组具有更高的并发症发生率。

2022年, Renieri等^[79]的一项回顾性多中心研究纳入了465例患者(93例抽吸取栓,133例支架取栓,239例联合取栓),数据分析显示,支架取栓($OR\ 9.2, 95\%CI\ 1.9\sim 44.6$)和联合取栓($OR\ 2.6, 95\%CI\ 1.1\sim 6.9$)与更高的血管再通(mTICI ≥ 2 b级)率相关,但也与更高的SAH发生率相关。2022年的另一项国际多中心研究纳入了213例MeVO患者,结果显示,上述3种手术方式治疗MeVO,血管再通率差异无统计学意义;针对抽吸取栓和支架取栓+抽吸取栓的倾向性评分匹配分析也未显示出不同手术策略对患者功能独立、血管成功再通和颅内出血的影响差异具有统计学意义^[64]。

7.2 MeVO血管内治疗专用材料的临床研究

2016年, Navia等^[80]报道了单中心应用

3MAX抽吸导管治疗MeVO的有效性和安全性。研究共纳入了6例患者,成功血管再通(mTICI ≥ 2 b级)率为100%,无手术相关并发症发生,出院时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为83%(5例)。研究结果提示,3MAX抽吸治疗MeVO是安全、有效的。

2019年, Crockett等^[81]报道了一项单中心采用微ADAPT (Micro-ADAPT, 使用小口径抽吸导管) 技术治疗MeVO的研究结果。该研究共纳入14例患者,入院时中位NIHSS评分为8分。该研究中,患者的成功再灌注(mTICI ≥ 2 b级)率为100%,无sICH发生,90 d病死率为0,90 d时有63%的患者达到了mRS评分 ≤ 2 分。研究结果提示,微ADAPT治疗MeVO闭塞是安全、有效的。

2020年, Romano等^[82]通过多中心回顾性研究对将ADAPT技术作为一线治疗策略治疗MeVO的有效性和安全性进行了总结,一共分析了44处MCA M2/M3段闭塞的治疗情况。入组患者治疗前的中位NIHSS评分为10分,治疗后成功血管再通率为90.9%,无手术相关并发症发生,90 d时mRS评分 ≤ 2 分的患者比例为70.5%。研究结果提示,应用ADAPT技术治疗MeVO是安全且有效的。

2020年, Pérez-García等^[4]提出了一种治疗MeVO的小支架铆定盲交换(blind exchange with mini-pinning, BEMP)技术(图1),通过对前瞻性数据库的事后分析,比较了该技术与常规支架取栓治疗MeVO的有效性和安全性。该研究共纳入了102例患者(106个闭塞病变),BEMP技术治疗组有56处闭塞病变,常规支架取栓治疗组有50处闭塞病变,BEMP技术治疗组的一次性成功血管再通率显著高于常规支架取栓治疗组(57% vs. 34%, $P=0.017$),sICH发生率(1.9% vs. 12.8%, $P=0.038$)、补救治疗率(7.1% vs. 22%, $P=0.028$)和远端血栓栓塞发生率(1.8% vs. 12%, $P=0.035$)显著低于常规

支架取栓治疗组；一次性成功血管再通为患者获得良好预后的独立预测因素。研究结果提示，BEMP技术治疗MeVO较传统支架取栓治疗更加安全有效。


2021年, Yoshimoto等^[83]报告了采用Tron取栓支架, 应用BEMP技术治疗MCA M2段闭塞患者的结果: 15例入组患者中, 一次取栓的成功血管再通 (eTICI \geq 2c级) 率为60%, sICH发生率为0, 90 d时mRS评分 \leq 2分的比例为47%, 90 d病死率为7%。研究结果提示, 采用Tron取栓支架和BEMP技术治疗MCA M2段闭塞安全且有效。

2022年Guenego等^[84]报道了应用新型小尺寸取栓支架 (Tigertriever 13) 治疗MeVO的结果: 入组的16例患者 (17处闭塞部位) 中, 成功血管再通 (mTICI \geq 2b级) 率达94% (16/17), SAH发生率为29%, 脑实质出血发生率为12%,

90 d mRS评分 \leq 2分的患者比例为65%。研究结果提示应用Tigertriever 13治疗MeVO是安全、有效的。

2022年, Goertz等^[85]报道了多中心应用小外径取栓支架API7[APERIO Hybrid¹⁷取栓支架, 可以使用0.017 in (1 in=2.54 cm) 的微导管输送, 适应的血管直径为1~4 mm]治疗MCA M2段闭塞的有效性和安全性。该研究共入组了29例MeVO患者, 基线中位NIHSS评分为10分, 成功血管再通 (mTICI \geq 2b级) 率达89.7%, 出院时中位NIHSS评分为2分, 90 d中位mRS评分为2分。研究结果提示, 小外径API7取栓支架治疗MCA M2段闭塞有良好的疗效。

2022年, Fischer等^[86]报道了单中心应用Tigertriever 13取栓支架治疗MeVO的有效性和安全性。研究共纳入43例MeVO患者, 成功血



BEMP—小支架铆钉盲交换; Quattro—支架联合双重抽吸; MAT—微导管联合抽吸导管双重抽吸; 1 F=0.33 mm; 1 in=2.54 cm。MeVO—中等血管闭塞。

图1 适用于MeVO血管内开通的技术介绍

Figure 1 Introduction of techniques suitable for MeVO endovascular recanalization

(资料来源: <https://doi.org/10.1161/strokeaha.120.030815>; <https://doi.org/10.1007/s00622-023-01317-8>; <https://doi.org/10.1177/15910199221133470>)

管再通 (mTICI \geq 2b级) 率为84.4%，一次性成功血管再通率为26.7%，出院时mRS评分 \leq 2分的患者比例为53.5%，sICH的发生率为7%。研究结果提示，Tigertriever 13取栓支架治疗MeVO有良好的安全性和疗效。

2022年，Grieb等^[87]报道了单中心2019—2021年微导管吸栓（微导管+抽吸导管的双抽吸取栓技术）治疗MeVO（MCA M3/M4段闭塞）的有效性和安全性。在纳入的19例患者中，一次操作达到TICI \geq 2b级的比例为58%，出院时平均NIHSS评分显著低于入院时（3分 vs. 12分， $P<0.001$ ），90 d时mRS评分 \leq 2分的比例为68%，sICH发生率为0。研究结果提示，双抽吸取栓技术（图1）治疗MCA M3/M4段闭塞是安全、有效的。

2023年，Zhao等^[88]报道的单中心回顾性研究共纳入44例MeVO患者，均采用3 mm Trevo NXT支架治疗，数据分析显示，患者的基线中位NIHSS评分为15分，一次性成功血管再通率为56.9%，最终达到mTICI \geq 2b级的比例为72.4%，急性期手术并发症发生率为2.4%，术后24 h的中位NIHSS评分为12分。研究结果提示，采用3 mm Trevo NXT支架治疗MeVO是安全、有效的。

2023年，Ntoulias等^[89]报道了多中心应用3 mm Solitaire X支架治疗MeVO的结果。该研究共纳入68例患者，一次成功血管再通（mTICI 2c/3级）率为32%，最终的血管再通率达89.7%，患者出院时中位NIHSS评分由入院时的11分降低至2分，无sICH发生。研究结果提示，应用3 mm Solitaire X支架治疗MeVO安全且有效。

2023年，Psychogios等^[90]报道了采用Quattro (quadriaxial approach) 技术治疗MeVO的单中心经验。研究结果提示，与传统的血管内治疗技术相比，Quattro技术治疗MeVO可获得更高的血管再通率以及更低的SAH发生率，采用Quattro技术治疗MeVO安全、有效（图1）。

2023年，Orscelik等^[91]通过多中心回顾性研究对比了使用球囊导管与不使用球囊导管进行血管内治疗对MeVO的有效性和安全性。该研究共纳入1508例患者，球囊导管组231例，未使用球囊导管组1277例，结果显示，球囊导管组的成功血管再通（mTICI \geq 2c级）率更低（43.2% vs. 52.7%， $P=0.01$ ），穿刺到通路建立时间（15 min vs. 8 min， $P<0.01$ ）和穿刺到血管再通时间（97 min vs. 34 min， $P<0.01$ ）更长，未使用球囊导管组90 d时mRS评分 \leq 2分的患者比例有高于球囊导管组的趋势，但差异未达统计学意义（45.6% vs. 37.9%， $P=0.08$ ）。亚组分析显示，Solumbra技术亚组中，球囊导管组的一次性成功血管再通率和90 d时mRS评分 \leq 2分的患者比例较低，但球囊导管组的远端栓塞率更低（8.8% vs. 14.9%， $P=0.03$ ）。研究结果提示，在MeVO患者中使用球囊导管与较低的mTICI评分、较低的一次性成功血管再通率、较长的手术时间相关，但使用球囊导管也与低远端栓塞率相关。

2023年，Monteiro等^[92]报道了应用Q抽吸导管治疗MeVO的国际多中心回顾性研究结果。该研究共纳入了美国和英国各2家中心的69例患者，患者的成功血管再通（mTICI \geq 2b级）率为92.8%，一次性再通率达68.1%，sICH发生率为2.9%。90 d时mRS评分 \leq 2分的患者比例为50%；继发性MeVO患者入院时的中位NIHSS评分高于原发性MeVO患者（19.5分 vs. 12分， $P=0.009$ ），原发性MeVO患者的90 d时mRS评分 \leq 2分的比例高于继发性MeVO患者（77.3% vs. 31.3%， $P=0.002$ ）。研究结果提示，应用Q抽吸导管治疗MeVO患者，尤其是治疗原发性MeVO患者安全、有效。

2023年，Adusumilli等^[93]报道了Tigertriever 13取栓支架对比其他支架治疗MeVO的meta分析，共纳入了11项研究，入组患者中应用Tigertriever 13支架者167例，应用其他取栓支架者1235例。研究结果发现，Tigertriever 13

与其他支架治疗MeVO有相似的血管再通率[83.2% (95%CI 71.5%~96.7%) vs. 81.6% (95%CI 75.3%~88.4%) , $P>0.05$], SAH的发生率差异也无统计学意义; 在病死率和良好预后率方面, 因目前的研究异质性较大, 不能进行meta分析。研究结果提示, 在MeVO患者的血管内治疗中, Tigertriever 13取栓支架与其他支架有相似的血管再通率和SAH发生率。

7.3 MeVO常规手术策略与BEMP技术的比较

2020年Haussen等^[94]通过一项多中心回顾性研究, 在169例MeVO患者中对比了BEMP技术与常规支架/抽吸取栓的效果, 结果显示, BEMP技术的FPF比例高于常规支架/抽吸取栓 (mTICI \geq 2b级比例: 80% vs. 56%, $P=0.03$; mTICI 3级比例: 60% vs. 40%, $P=0.07$), 但BEMP技术与常规支架/抽吸取栓的最终血管再通率 (84% vs. 79%, $P=0.58$)、死亡率 (21% vs. 21%, $P>0.99$) 以及SAH发生率 (12% vs. 6%, $P=0.30$) 差异均未达统计学意义。


2020年, P é rez-Garc í a等^[4]在106例MeVO患者中对比了BEMP技术 (56例) 和支架取栓 (50例) 的效果, 结果显示, BEMP技术具有更高的eTICI $>2c$ 级比例 (66.1% vs. 46.0%, $P=0.037$), 而且sICH的发生率更低

(1.9% vs. 12.8%, $P=0.038$), 但两组间的90 d死亡率 (20.8% vs. 22.4%, $P=0.835$) 和功能独立率 (50.9% vs. 53.1%, $P=0.831$) 差异无统计学意义。

综上所述, 与LVO专用支架相比, 目前新型的、专用于MeVO的小口径抽吸导管和取栓支架的尺寸更合适, 对血管的牵拉更小, 具有更高的安全性。BEMP技术可能提升MeVO患者的血管再通率, 但是其对术者的操作要求以及对MeVO专用器械的要求也更高, 仍需高质量研究进一步证实其临床适用性、安全性和有效性。对于可疑MeVO的患者, 我们推荐采用规范化诊疗策略流程 (图2)。

7.4 MeVO血管内治疗的麻醉策略

与LVO的麻醉策略相似, MeVO的麻醉策略也包括全身麻醉、局部麻醉和局部麻醉+镇静治疗, 然而目前尚无针对性的高级别研究来证实不同麻醉方式的优劣。2024年, Meyer等^[95]通过一项多中心回顾性研究比较了不同麻醉方式对血管内治疗MeVO的影响。该研究共纳入了233例患者, 其中119例 (51.1%) 采用了局部麻醉+镇静治疗, 114例 (48.9%) 采用了全身麻醉方式。基线资料中, 全身麻醉组的基线NIHSS评分显著高于局部麻醉+镇静治疗组



MeVO—中等血管闭塞。

图2 MeVO治疗策略推荐流程

Figure 2 Flowchart of recommended treatment strategies for MeVO

($P=0.022$)；结局指标分析中，两组的成功血管再通 (TICI ≥ 2 b级) 率 (73.9% vs. 71.9%, $P=0.729$)、sICH发生率 (2.5% vs. 1.8%, $P=1.0$) 和90 d病死率 (15.7% vs. 17.2%, $P=0.913$) 差异均无统计学意义，局部麻醉+镇静治疗组90 d时mRS评分 ≤ 1 分的患者比例高于全身麻醉组。亚组分析发现，前循环 (ACA A2~A4段闭塞) MeVO患者采用局部麻醉+镇静治疗较全身麻醉有更高的成功血管开通率 ($aOR 3.07$, 95% $CI 1.24\sim 7.57$, $P=0.015$)。整体研究结果提示，对于MeVO患者的血管内治疗，局部麻醉+镇静治疗与全身麻醉有相似的成功血管开通率和sICH发生率，局部麻醉+镇静治疗较全身麻醉有更多的90 d时mRS评分 ≤ 1 分的患者比例，但是不排除该差异是由两组基线神经功能缺损的显著差异所致。另外，该研究的亚组分析显示，ACA的MeVO患者更多的是采用全身麻醉策略 ($aOR 3.07$, 95% $CI 1.24\sim 7.57$, $P=0.015$)，但不同麻醉策略对患者的血管成功再通率和90 d良好预后率没有影响。

MeVO的血管内治疗往往需要更精准、更清晰的路图以通过闭塞段；另外，MeVO的闭塞段常位于动脉分叉位置，此时更需要术中通过精准、轻柔的操作以超选责任血管。结合以上原因，全身麻醉策略似乎更适合于MeVO的血管内治疗，但仍需更多高质量的研究以证实。

推荐意见

①MeVO的血管内治疗有良好的安全性和有效性，在有经验的中心，对符合以下条件的MeVO所致非轻型AIS (定义如下) 可以采用血管内治疗，具体方法包括单纯抽吸、支架取栓、支架联合抽吸等 (II级推荐)。

a. 解剖节段：MCA M2~M4段，ACA A1~A4段，PCA P1~P4段，AICA, PICA和SCA。

b. 血管直径：0.75~2 mm。

c. 临床症状：NIHSS评分 >5 分，或NIHSS评分3~5分伴有严重失语、偏盲或偏瘫/单肢功能丧失等致残性临床症状。

②MeVO的血管内治疗应根据靶血管的解剖特征 (如路径、血管的直径等) 采用治疗中心擅长的技术方法，尽量选择与靶血管解剖特征匹配的专门用于远端血管的材料和血管内治疗器械 (I级推荐)。

③对于MeVO血管内治疗的麻醉策略，在保证手术安全的基础上，建议采用全身麻醉方式 (II级推荐)。

8 展望

作为目前脑血管病取栓治疗中备受关注的MeVO治疗，相关研究和临床工作都方兴未艾。首先是更适合MeVO治疗的血管介入器械在不断发展，这些新的取栓产品适合更远端、更小直径血管的取栓，提高了MeVO的取栓效力，也增加了其安全性。新的取栓产品包括取栓支架和抽吸导管，适合直径0.75~2 mm的中等血管 (表2~表3)。其次，目前国际上注册的多项MeVO血管内治疗相关大型临床研究正在进行 (表4)，我们期待这些研究的结果为MeVO的血管内治疗提供更为坚实的循证医学证据。同时我们也应认识到，MeVO的远端血管取栓因为更复杂的血管解剖情况，面临更高的并发症发生率可能，因此，治疗前精准的评估和选择适应远端血管取栓的专用器械，并具备成熟的血管内治疗经验以及处理并发症的能力，才能更有效地惠及患者。

注：本文汇总不同研究的发表数据，存在相同指标的小数点后位数不一致情况。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突。

表2 适用于MeVO的取栓支架物理特性

Table 2 Physical properties of thrombectomy stents suitable for MeVO

产品	是否可以解脱	直径/mm	有效长度/mm	适应血管直径/mm	网孔设计	标记(远端/近端)	最小输送微导管内径/in
Tigertriever	否	3.0	23	1.5~2.5	闭环	显影丝	0.017
瑞康通	否	2.5	15	1.5~2.5	闭环	显影丝	0.017
泰杰伟业	否	3.0/3.5	10/20/25/30, 15/20/25/30/35/40	1.5~4.0 2.0~3.5	闭环	显影点	0.021
Solitaire X	否	4.0	20/40	1.5~3.0	开放卷曲, 闭环	显影点	0.021
Solitaire FR	是	4.0	15/20	2.0~4.0	开放卷曲, 闭环	显影点	0.021
心玮	否	3.0	15/20	1.5~3.0	闭环	显影点	0.021
Acandis	否	3.5	28	1.5~3.5	开闭环复合设计	黄金显影点	0.0165
心凯诺	否	3.0	20	1.5~3.0	闭环	显影点	0.017
通桥	否	3.0	15/20/25/30	1.5~3.0	闭环	显影点	0.021
赛诺	否	3.0	20/25/30	1.5~3.0	闭环	显影丝, 显影点	0.017
加奇	否	3.0	25	2.0~3.0	闭环	显影丝	0.017
尼科	否	3.0	10/20/30	2.0~3.0	闭环	显影点	0.021
禾木	否	3.0	10/20	2.0~3.0	闭环	显影丝, 显影点	0.021
Trveo XP	否	3.0	20	—	闭环	显影丝	0.017
Trevo NXT	否	3.0	32	1.5~3.0	闭环	显影丝	0.017
中天	否	3.5	30	2.0~3.5	闭环	显影点	0.017
久是神康	否	3.0	20	1.5~3.0	闭环	显影点	0.017

注: 1 in=2.54 cm。MeVO—中等血管闭塞。

表3 适用于MeVO的抽吸导管/中间导管的物理特性

Table 3 Physical properties of aspiration catheters/intermediate catheters suitable for MeVO

产品	简称	注册名称	有效长度/cm	外径/F	内腔直径/in
泰捷伟业	Leechor	血栓抽吸导管系统	125/130/140/150/160	4.1/4.9	0.038/0.048
泓懿医疗	Penumbra System MAX	血栓抽吸导管系统	153/132	—	0.035/0.041
禾木吉威	Afentta	颅内血栓抽吸导管	143/158/132/134/144	—	0.035/0.045
心凯诺	SkyDragon	血栓抽吸导管	130/140/148	4.0	0.041
心凯诺	Sky Surfer	远端通路导管	125/130/140/148	4.0	0.041
玮铭医疗	FlowPlus	颅内血栓抽吸导管	153	4.0	0.035
深瑞达	Solar	颅内抽吸导管	105/115/125/132/145/160	—	0.038
深瑞达	Venus	远端通路导管	139/153	—	0.044
史赛克	DAC	远端通路导管 Distal Access Catheter	115/125/130/136	—	0.030/0.044
山东维心	Velink	远端通路导管 Distal Access Catheter	115/132/150	—	0.044
柯惠医疗	Phenom Plus	可塑型微导管	105/120	4.2	0.044
久是神康	StreamPlus	远端通路导管 Distal Access Catheter	139/153	4.0	0.044
久是神康	Valent	颅内支撑导管	115/130/139	4.0	0.044
艾柯	Cosine45	远端通路导管 Distal Access Catheter	70~140	4.6	0.046
赛诺	Novarail	远端通路导管 Distal Access Catheter	158/145	—	0.038/0.045

注: 1 F=0.33 mm; 1 in=2.54 cm。MeVO—中等血管闭塞。

表4 正在进行的MeVO血管内治疗随机对照试验
Table 4 Ongoing randomized controlled trials of endovascular treatment for MeVO

研究	ESCAPE-MeVO	DISTAL	DISCOUNT	DISTALS	DUSK	ORIENTAL-MeVO	Frontier AP
研究注册号	NCT05151172	NCT05029414	NCT05030142	NCT05152524	NCT05983757	NCT06146790	ACTRN12621001746820p
样本量/例	530	526	488	168	564	564	—
地区	美国, 加拿大, 德国, 英国	欧洲	法国	美国, 欧洲	美国	中国	澳大利亚, 中国
闭塞部位	MCA M2/M3段, ACA A2/A3段, PCA P2/P3段	共/非优势MCA M2段, M3/M4段, ACA A1/A2/A3段, PCA P1/P2/P3段	MCA远端 M2/M3段, ACA A1/A2/A3段, PCA P1/P2/P3段	ACA, MCA M2/M3段, PCA 血管直径 ≥1.5 mm	非优势MCA M2段 (<2.5 mm) 或M3段, ACA A1/A2/A3段, PCA P1/P2/P3段	ACA, MCA M2段 (<2.5 mm), M3段, PCA	MCA M2段 (近、中、远) /M3段, ACA A1/A2段
NIHSS评分	>5分 或3~5分合并致残性卒中	≥4分 或致残性卒中	≥5分	4~24分 或2~24分合并失语和(或)偏盲	>5分 或3~5分合并失语、偏盲或偏瘫/肢体功能丧失等	>5分 或3~5分合并失语、偏盲或偏瘫/肢体功能丧失等	≥5分, 或<5分合并言语功能障碍
年龄/岁	≥18	≥18	≥18	18~85	≥18	≥18	≥18
发病时间	<12 h LKW	<6 h LKW 6~24 h LKW	<6 h LKW	随机化<24 h LKW	<2 h LKW	<12 h LKW	<9 h LKW
主要终点	90 d mRS评分	90 d mRS评分	90 d mRS评分 0~2分	24 h后成功再灌注 (CTP或MRI PWI*), 无sICH	90 d mRS评分	90 d mRS评分	90 d mRS评分
研究开始时间	2021-12-09	2021-08-31	2021-09-01	2021-12-10	2024-04-02	2023-11-27	2021-09-04

注: MeVO—中等血管闭塞; ESCAPE-MeVO—MeVO相关随机对照试验如血管内治疗提高MeVO预后研究; DISTAL—血管内治疗联合最佳内科治疗对比最佳内科治疗MeVO卒中研究; DISCOUNT—评估血管内取栓治疗远端动脉闭塞急性缺血性卒中研究; DISTALS—可调节小轮廓支架治疗远端缺血性卒中研究; DUSK—远端MeVO所致卒中联合取栓; ORIENTAL-MeVO—评估血管内治疗急性颅内MeVO卒中研究; Frontier AP—血管内治疗对比标准内科治疗MeVO的临床预后和安全性的随机对照试验; MCA—大脑中动脉; ACA—大脑前动脉; PCA—大脑后动脉; LKW—最后看起来正常; sICH—症状性颅内出血。

撰写组成员

孙 瑄 首都医科大学附属北京天坛医院
 杨 明 首都医科大学附属北京天坛医院
 孙大鹏 首都医科大学附属北京天坛医院
 李光建 重庆大学附属沙坪坝医院
 陈 林 陆军军医大学西南医院

讨论专家 (按姓名拼音排序)

曹 毅 昆明医科大学第二附属医院
 陈 纯 昆明医科大学第一附属医院
 陈 林 陆军军医大学西南医院
 陈康宁 陆军军医大学西南医院
 陈胜利 重庆大学附属三峡医院
 陈文伙 福建医科大学附属协和医院
 董 强 复旦大学附属华山医院
 高 峰 首都医科大学附属北京天坛医院
 高连波 中国医科大学附属第四医院
 高小平 湖南省人民医院
 管 生 郑州大学第一附属医院
 韩 巨 山东省千佛山医院
 韩红星 临沂市人民医院

韩建峰 西安交通大学第一附属医院
 胡 波 华中科技大学同济医学院附属同济医院
 胡 伟 中国科学技术大学附属第一医院
 霍晓川 首都医科大学附属北京安贞医院
 吉训明 首都医科大学
 姜长春 包头市中心医院
 焦力群 首都医科大学宣武医院
 李 迪 大连市中心医院
 李光建 重庆大学附属沙坪坝医院
 李光宗 成都市第六人民医院
 李经伦 西南医科大学附属医院
 李天晓 河南省人民医院
 刘 圣 江苏省人民医院
 刘建民 海军军医大学第一附属医院
 刘丽萍 首都医科大学附属北京天坛医院
 刘新峰 中国人民解放军东部战区总医院
 刘亚杰 南方医科大学深圳医院
 罗 云 南京鼓楼医院
 罗小晶 成都市第六人民医院

马宁 首都医科大学附属北京天坛医院
 缪中荣 首都医科大学附属北京天坛医院
 莫大鹏 首都医科大学附属北京天坛医院
 南光贤 吉林大学中日联谊医院
 彭亚 常州市第一人民医院
 彭小祥 湖北省第三人民医院
 史怀璋 哈尔滨医科大学附属第一医院
 帅杰 陆军军医大学第二附属医院
 (新桥医院)
 孙瑄 首都医科大学附属北京天坛医院
 汪银洲 福建省立医院
 王君 解放军总医院第一医学中心
 王力 自贡市第三人民医院
 王守春 吉林大学白求恩第一医院
 王伊龙 首都医科大学附属北京天坛医院
 王拥军 首都医科大学附属北京天坛医院
 魏铭 天津市环湖医院
 温昌明 南阳市中心医院
 吴伟 山东大学齐鲁医院
 肖力 陆军军医大学西南医院
 徐安定 暨南大学附属第一医院
 许予明 郑州大学第一附属医院
 阎龙 吉林大学白求恩第二医院
 杨华 贵州医科大学附属医院
 杨弋 吉林大学白求恩第一医院
 易婷玉 福建省漳州市医院
 袁光雄 湘潭市中心医院
 曾进胜 中山大学附属第一医院
 张帆 海南省人民医院
 张猛 第三军医大学大坪医院
 张睿 新疆医科大学第七附属医院
 赵性泉 首都医科大学附属北京天坛医院
 赵振伟 空军军医大学唐都医院
 郑洪波 四川大学华西医院
 朱良付 河南省人民医院

参考文献

- [1] GROSSBERG J A, REBELLO L C, HAUSSEN D C, et al. Beyond large vessel occlusion strokes: distal occlusion thrombectomy[J]. *Stroke*, 2018, 49 (7) : 1662-1668.
- [2] MISTRY E A, DUMONT A S. Medium vessel occlusion and acute ischemic stroke: a call for treatment paradigm reappraisal[J]. *Stroke*, 2020, 51 (11) : 3200-3202.
- [3] OSPEL J M, MENON B K, DEMCHUK A M, et al. Clinical course of acute ischemic stroke due to medium vessel occlusion with and without intravenous alteplase treatment[J]. *Stroke*, 2020, 51 (11) : 3232-3240.
- [4] PÉREZ-GARCÍA C, MOREU M, ROSATI S, et al. Mechanical thrombectomy in medium vessel occlusions: blind exchange with mini-pinning technique versus mini stent retriever alone[J]. *Stroke*, 2020, 51 (11) : 3224-3231.
- [5] SAVER J L, CHAPOT R, AGID R, et al. Thrombectomy for distal, medium vessel occlusions: a consensus statement on present knowledge and promising directions[J]. *Stroke*, 2020, 51 (9) : 2872-2884.
- [6] GOYAL M, OSPEL J M, MENON B K, et al. MeVO: the next frontier? [J]. *J Neurointerv Surg*, 2020, 12 (6) : 545-547.
- [7] MENON B K, HILL M D, DAVALOS A, et al. Efficacy of endovascular thrombectomy in patients with M2 segment middle cerebral artery occlusions: meta-analysis of data from the HERMES collaboration[J]. *J Neurointerv Surg*, 2019, 11 (11) : 1065-1069.
- [8] KOBEISSI H, BILGIN C, GHOZY S, et al. A review of acute ischemic stroke caused by distal, medium vessel occlusions[J/OL]. *Interv Neuroradiol*, 2023; 15910199231197616[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1177/15910199231197616>.
- [9] HELDNER M R, HSIEH K, BROEG-MORVAY A, et al. Clinical prediction of large vessel occlusion in anterior circulation stroke: mission impossible? [J]. *J Neurol*, 2016, 263 (8) : 1633-1640.
- [10] RAI A T, DOMICO J R, BUSEMAN C, et al. A population-based incidence of M2 strokes indicates potential expansion of large vessel occlusions amenable to endovascular therapy[J]. *J Neurointerv Surg*, 2018, 10 (6) : 510-515.
- [11] SMITH W S, LEV M H, ENGLISH J D, et al. Significance of large vessel intracranial occlusion causing acute ischemic stroke and TIA[J]. *Stroke*, 2009, 40 (12) : 3834-3840.
- [12] ZHAO H, COOTE S, PESAVENTO L, et al. Large vessel occlusion scales increase delivery to endovascular centers without excessive harm from misclassifications[J]. *Stroke*, 2017, 48 (3) : 568-573.
- [13] DULOQUIN G, GRABER M, GARNIER L, et al. Incidence of acute ischemic stroke with visible arterial occlusion: a population-based study (Dijon stroke registry) [J]. *Stroke*, 2020, 51 (7) : 2122-2130.
- [14] PISCOPO A, ZANATY M, DLOUHY K. Contemporary methods for detection and intervention of distal medium and small vessel occlusions[J/OL]. *J Clin Med*, 2023, 12 (18) : 6071[2024-10-11].

- <https://doi.org/10.3390/jcm12186071>.
- [15] KAESMACHER J, MAEGERLEIN C, KAESMACHER M, et al. Thrombus migration in the middle cerebral artery: incidence, imaging signs, and impact on success of endovascular thrombectomy [J/OL]. *J Am Heart Assoc*, 2017, 6 (2) : e005149 [2024-10-11]. <https://doi.org/10.1161/jaha.116.005149>.
- [16] GOYAL M, KAPPELHOF M, MCDONOUGH R, et al. Secondary medium vessel occlusions: when clots move north[J]. *Stroke*, 2021, 52 (3) : 1147-1153.
- [17] OSPEL J M, CIMFLOVA P, MARKO M, et al. Prevalence and outcomes of medium vessel occlusions with discrepant infarct patterns[J]. *Stroke*, 2020, 51 (9) : 2817-2824.
- [18] LIU M, NASR D, BRINJIKJI W. The incidence of medium vessel occlusions: a population-based study [J/OL]. *Front Neurol*, 2023, 14: 1225066[2024-10-11]. <https://doi.org/10.3389/fneur.2023.1225066>.
- [19] LIMA F O, FURIE K L, SILVA G S, et al. Prognosis of untreated strokes due to anterior circulation proximal intracranial arterial occlusions detected by use of computed tomography angiography[J]. *JAMA Neurol*, 2014, 71 (2) : 151-157.
- [20] SHETH S A, YOO B, SAVER J L, et al. M2 occlusions as targets for endovascular therapy: comprehensive analysis of diffusion/perfusion MRI, angiography, and clinical outcomes[J]. *J Neurointerv Surg*, 2015, 7 (7) : 478-483.
- [21] FASEN B A C M, HEIJBOER R J J, HULSMANS F J H, et al. CT angiography in evaluating large-vessel occlusion in acute anterior circulation ischemic stroke: factors associated with diagnostic error in clinical practice[J]. *AJNR Am J Neuroradiol*, 2020, 41 (4) : 607-611.
- [22] KUNZ W G, SOMMER W H, HAVLA L, et al. Detection of single-phase CTA occult vessel occlusions in acute ischemic stroke using CT perfusion-based wavelet-transformed angiography[J]. *Eur Radiol*, 2017, 27 (6) : 2657-2664.
- [23] MATTERN H, SCIARRA A, GODENSCHWEGER F, et al. Prospective motion correction enables highest resolution time-of-flight angiography at 7 T[J]. *Magn Reson Med*, 2018, 80 (1) : 248-258.
- [24] PARK C A, KANG C K, KIM Y B, et al. Advances in MR angiography with 7 T MRI: from microvascular imaging to functional angiography[J/OL]. *Neuroimage*, 2018, 168: 269-278[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2017.01.019>.
- [25] AMUKOTUWA S A, WU A, ZHOU K, et al. Distal medium vessel occlusions can be accurately and rapidly detected using T_{max} maps[J]. *Stroke*, 2021, 52 (10) : 3308-3317.
- [26] BECKS M J, MANNIESING R, VISTER J, et al. Brain CT perfusion improves intracranial vessel occlusion detection on CT angiography[J]. *J Neuroradiol*, 2019, 46 (2) : 124-129.
- [27] SOUSA J A, SONDERMANN A, BERNARDO-CASTRO S, et al. CTA and CTP for detecting distal medium vessel occlusions: a systematic review and meta-analysis[J]. *AJNR Am J Neuroradiol*, 2023, 45 (1) : 51-56.
- [28] DUVEKOT M H C, VAN ES A C G M, VENEMA E, et al. Accuracy of CTA evaluations in daily clinical practice for large and medium vessel occlusion detection in suspected stroke patients[J]. *Eur Stroke J*, 2021, 6 (4) : 357-366.
- [29] GUPTA A, GARG P K, KHERA P S, et al. Multiphase computed tomography angiography (mCTA) derived source images in acute ischemic stroke: beyond collaterals. Can it obviate the need for computed tomography perfusion (CTP) ? [J/OL]. *Clin Neurol Neurosurg*, 2022, 222: 107421[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2022.107421>.
- [30] AMUKOTUWA S A, WU A, ZHOU K, et al. Time-to-maximum of the tissue residue function improves diagnostic performance for detecting distal vessel occlusions on CT angiography[J]. *AJNR Am J Neuroradiol*, 2021, 42 (1) : 65-72.
- [31] ALOTAIBI F F, ALSHAHRANI A, MOHAMED G, et al. Diagnostic accuracy of large and medium vessel occlusions in acute stroke imaging by neurology residents and stroke fellows: a comparison of CT angiography alone and CT angiography with CT perfusion[J]. *Eur Stroke J*, 2024, 9 (2) : 356-365.
- [32] MOHAMMADEN M H, DOHEIM M F, ELFIL M, et al. Direct to angiosuite versus conventional imaging in suspected large vessel occlusion: a systemic review and meta-analysis[J]. *Stroke*, 2022, 53 (8) : 2478-2487.
- [33] REQUENA M, OLIVÉ-GADEA M, MUCHADA M, et al. Direct to angiography suite without stopping for computed tomography imaging for patients with acute stroke: a randomized clinical trial[J]. *JAMA Neurol*, 2021, 78 (9) : 1099-1107.
- [34] SENERS P, TURC G, MAÏER B, et al. Incidence and predictors of early recanalization after intravenous thrombolysis: a systematic review and meta-analysis[J]. *Stroke*, 2016, 47 (9) : 2409-2412.
- [35] MENON B K, AL-AJLAN F S, NAJM M, et al. Association of clinical, imaging, and thrombus characteristics with recanalization of visible intracranial occlusion in patients with acute ischemic stroke[J]. *JAMA*, 2018, 320 (10) : 1017-1026.

- [36] YOO J, BAEK J H, PARK H, et al. Thrombus volume as a predictor of nonrecanalization after intravenous thrombolysis in acute stroke[J]. *Stroke*, 2018, 49 (9) : 2108-2115.
- [37] FURLAN A, HIGASHIDA R, WECHSLER L, et al. Intra-arterial prourokinase for acute ischemic stroke. The PROACT II study: a randomized controlled trial. Prolyse in acute cerebral thromboembolism[J]. *JAMA*, 1999, 282 (21) : 2003-2011.
- [38] SARRAJ A, SANGHA N, HUSSAIN M S, et al. Endovascular therapy for acute ischemic stroke with occlusion of the middle cerebral artery M2 segment[J]. *JAMA Neurol*, 2016, 73 (11) : 1291-1296.
- [39] QURESHI A I, SALEEM M A, AYTAC E. Comparison of endovascular treatment with intravenous thrombolysis for isolated M2 segment of middle cerebral artery occlusion in acute ischemic stroke[J]. *J Vasc Interv Neurol*, 2017, 9 (5) : 8-14.
- [40] MEYER L, STRACKE C P, JUNGI N, et al. Thrombectomy for primary distal posterior cerebral artery occlusion stroke: the TOPMOST study[J]. *JAMA Neurol*, 2021, 78 (4) : 434-444.
- [41] WANG J, QIAN J C, FAN L, et al. Efficacy and safety of mechanical thrombectomy for M2 segment of middle cerebral artery: a systematic review and meta-analysis[J]. *J Neurol*, 2021, 268 (7) : 2346-2354.
- [42] SABER H, DESAI S M, HAUSSEN D, et al. Endovascular therapy vs. medical management for patients with acute stroke with medium vessel occlusion in the anterior circulation[J/OL]. *JAMA Netw Open*, 2022, 5 (10) : e2238154[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.38154>.
- [43] MARCHAL A, BRETZNER M, CASOLLA B, et al. Endovascular thrombectomy for distal medium vessel occlusions of the middle cerebral artery: a safe and effective procedure[J/OL]. *World Neurosurg*, 2022, 160: e234-e241[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2021.12.113>.
- [44] MEYER L, STRACKE P, BROOCKS G, et al. Thrombectomy versus medical management for isolated anterior cerebral artery stroke: an international multicenter registry study[J/OL]. *Radiology*, 2023, 307 (2) : e220229[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1148/radiol.220229>.
- [45] LOH E W, TOH K Z X, KWOK G Y R, et al. Endovascular therapy for acute ischemic stroke with distal medium vessel occlusion: a systematic review and meta-analysis[J/OL]. *J Neurointerv Surg*, 2023, 15 (e3) : e452-e459[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1136/jnis-2022-019717>.
- [46] KIM C H, KIM S E, JEON J P. Meta-analysis of endovascular treatment for acute M2 occlusion[J]. *J Korean Neurosurg Soc*, 2019, 62 (2) : 193-200.
- [47] NAKANO T, SHIGETA K, OTA T, et al. Efficacy and safety of mechanical thrombectomy for occlusion of the second segment of the middle cerebral artery: retrospective analysis of the Tama-registry of acute endovascular thrombectomy (TREAT) [J]. *Clin Neuroradiol*, 2020, 30 (3) : 481-487.
- [48] JUMAA M A, CASTONGUAY A C, SALAHUDDIN H, et al. Middle cerebral artery M2 thrombectomy in the STRATIS registry[J]. *Stroke*, 2021, 52 (11) : 3490-3496.
- [49] SHEK K, ALCOCK S, GHROODA E, et al. Effectiveness and safety of endovascular thrombectomy for large versus medium vessel occlusions: a single-center experience[J/OL]. *J Neurointerv Surg*, 2022, 14 (5) : neurintsurg-2021-017502[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-017502>.
- [50] SUN D P, LIU R, HUO X C, et al. Endovascular treatment for acute ischaemic stroke due to medium vessel occlusion: data from ANGEL-ACT registry[J]. *Stroke Vasc Neurol*, 2022, 8 (1) : 51-58.
- [51] GROSSBERG J A, CHALHOUB R M, AL KASAB S, et al. Multicenter investigation of technical and clinical outcomes after thrombectomy for proximal medium vessel occlusion (pMeVO) by frontline technique[J]. *Interv Neuroradiol*, 2024, 30 (4) : 470-479.
- [52] HERZBERG M, DORN F, TRUMM C, et al. Middle cerebral artery M2 thrombectomy: safety and technical considerations in the German stroke registry (GSR) [J/OL]. *J Clin Med*, 2022, 11 (15) : 4619[2024-10-11]. <https://doi.org/10.3390/jcm11154619>.
- [53] SCHULZE-ZACHAU V, BREHM A, NTOULIAS N, et al. Incidence and outcome of perforations during medium vessel occlusion compared with large vessel occlusion thrombectomy[J]. *J Neurointerv Surg*, 2024, 16 (8) : 775-780.
- [54] CASCIO RIZZO A, SCHWARZ G, CERVO A, et al. Safety and efficacy of endovascular thrombectomy for primary and secondary MeVO[J/OL]. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 2024, 33 (1) : 107492[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2023.107492>.
- [55] COUTINHO J M, LIEBESKIND D S, SLATER L A, et al. Mechanical thrombectomy for isolated M2 occlusions: a post hoc analysis of the STAR, SWIFT, and SWIFT PRIME studies[J]. *AJNR Am J Neuroradiol*, 2016, 37 (4) : 667-672.
- [56] BHOGAL P, BÜCKE P, AGUILAR PÉREZ M, et al. Mechanical thrombectomy for M2 occlusions: a

- single-centre experience[J]. *Interv Neurol*, 2017, 6 (3/4) : 117-125.
- [57] CHEN C J, WANG C, BUELL T J, et al. Endovascular mechanical thrombectomy for acute middle cerebral artery M2 segment occlusion: a systematic review [J/OL]. *World Neurosurg*, 2017, 107: 684-691[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2017.08.108>.
- [58] SABER H, NARAYANAN S, PALLA M, et al. Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke with occlusion of the M2 segment of the middle cerebral artery: a meta-analysis[J]. *J Neurointerv Surg*, 2018, 10 (7) : 620-624.
- [59] COMPAGNE K C J, VAN DER SLUIJS P M, VAN DEN WIJNGAARD I R, et al. Endovascular treatment: the role of dominant caliber M2 segment occlusion in ischemic stroke[J]. *Stroke*, 2019, 50 (2) : 419-427.
- [60] CAPPELLARI M, SAIA V, PRACUCCI G, et al. Different endovascular procedures for stroke with isolated M2-segment MCA occlusion: a real-world experience[J]. *J Thromb Thrombolysis*, 2021, 51 (4) : 1157-1162.
- [61] WANG M, FAROUKI Y, HULSCHER F, et al. Early neurological improvement predicts clinical outcome after thrombectomy for distal medium vessel occlusions[J/OL]. *Front Neurol*, 2022, 13: 809066[2024-10-11]. <https://doi.org/10.3389/fneur.2022.809066>.
- [62] MEYER L, STRACKE C P, WALLOCHA M, et al. Thrombectomy for secondary distal, medium vessel occlusions of the posterior circulation: seeking complete reperfusion[J]. *J Neurointerv Surg*, 2022, 14 (7) : 654-659.
- [63] MUSZYNSKI P, ANADANI M, RICHARDS S, et al. Endovascular reperfusion of M2 occlusions in acute ischemic stroke reduced disability and mortality: ETIS registry results[J/OL]. *J Neurointerv Surg*, 2022, 14 (5) : neurintsurg-2021-017380[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1136/neurintsurg-2021-017380>.
- [64] ALAWIEH A M, CHALHOUB R M, AL KASAB S, et al. Multicenter investigation of technical and clinical outcomes after thrombectomy for distal vessel occlusion by frontline technique[J/OL]. *J Neurointerv Surg*, 2023, 15 (e1) : e93-e101[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1136/jnis-2022-019023>.
- [65] KNIEP H, MEYER L, BROOCKS G, et al. Predictors of functional outcome after thrombectomy for M2 occlusions: a large scale experience from clinical practice[J/OL]. *Sci Rep*, 2023, 13 (1) : 18740 [2024-10-11]. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-45232-x>.
- [66] WINKELMEIER L, HEITKAMP C, FAIZY T D, et al. Prognostic value of recanalization attempts in endovascular therapy for M2 segment middle cerebral artery occlusions[J]. *Int J Stroke*, 2024, 19 (4) : 422-430.
- [67] RADU R A, COSTALAT V, FAHED R, et al. First pass effect as an independent predictor of functional outcomes in medium vessel occlusions: an analysis of an international multicenter study[J]. *Eur Stroke J*, 2024, 9 (1) : 114-123.
- [68] RODRIGUEZ-CALIENES A, VIVANCO-SUAREZ J, SEQUEIROS J M, et al. Mechanical thrombectomy for the treatment of primary and secondary distal medium-vessel occlusion stroke: systematic review and meta-analysis[J/OL]. *J Neurointerv Surg*, 2023, 15 (e3) : e460-e467[2024-10-11]. <https://doi.org/doi:10.1136/jnis-2022-019975>.
- [69] NOME T, ENRIQUEZ B, NOME C G, et al. Clinical outcome after thrombectomy in patients with MeVO stroke: importance of clinical and technical factors[J]. *J Neurol*, 2024, 271 (2) : 877-886.
- [70] RIZZO F, ROMOLI M, SIMONETTI L, et al. Reperfusion strategies in stroke with medium-to-distal vessel occlusion: a prospective observational study[J]. *Neurol Sci*, 2024, 45 (3) : 1129-1134.
- [71] FAROUKI Y, BONNET T, MINE B, et al. First-pass effect predicts clinical outcome and infarct growth after thrombectomy for distal medium vessel occlusions[J]. *Neurosurgery*, 2022, 91 (6) : 913-919.
- [72] GORY B, LAPERGUE B, BLANC R, et al. Contact aspiration versus stent retriever in patients with acute ischemic stroke with M2 occlusion in the ASTER randomized trial (contact aspiration versus stent retriever for successful revascularization) [J]. *Stroke*, 2018, 49 (2) : 461-464.
- [73] PHAN K, MAINGARD J, KOK H K, et al. Contact aspiration versus stent-retriever thrombectomy for distal middle cerebral artery occlusions in acute ischemic stroke: meta-analysis[J]. *Neurointervention*, 2018, 13 (2) : 100-109.
- [74] ATCHANEYASAKUL K, MALIK A M, YAVAGAL D R, et al. Thrombectomy outcomes in acute ischemic stroke due to middle cerebral artery M2 occlusion with stent retriever versus aspiration: a multicenter experience[J]. *Interv Neurol*, 2020, 8 (2/6) : 180-186.
- [75] BERNSEN M L E, GOLDHOORN R-J B, LINGSMA H F, et al. Importance of occlusion site for thrombectomy technique in stroke: comparison between aspiration and stent retriever[J]. *Stroke*, 2021, 52 (1) : 80-90.
- [76] MEYER L, STRACKE P, WALLOCHA M, et al. Aspiration versus stent retriever thrombectomy for distal, medium vessel occlusion stroke in the posterior

- circulation; a subanalysis of the TOPMOST study[J]. *Stroke*, 2022, 53 (8) : 2449-2457.
- [77] TOH K Z X, KOH M Y, LOH E W, et al. Distal medium vessel occlusions in acute ischaemic stroke -stent retriever versus direct aspiration; a systematic review and meta-analysis[J]. *Eur Stroke J*, 2023, 8 (2) : 434-447.
- [78] BILGIN C, HARDY N, HUTCHISON K, et al. First-line thrombectomy strategy for distal and medium vessel occlusions; a systematic review[J]. *J Neurointerv Surg*, 2023, 15 (6) : 539-546.
- [79] RENIERI L, VALENTE I, DMYTRIW A A, et al. Mechanical thrombectomy beyond the circle of Willis; efficacy and safety of different techniques for M2 occlusions[J]. *J Neurointerv Surg*, 2022, 14 (6) : 546-550.
- [80] NAVIA P, LARREA J A, PARDO E, et al. Initial experience using the 3MAX cerebral reperfusion catheter in the endovascular treatment of acute ischemic stroke of distal arteries[J]. *J Neurointerv Surg*, 2016, 8 (8) : 787-790.
- [81] CROCKETT M T, PHILLIPS T J, CHIU A H Y. Dual suction Headway27 microcatheter thrombectomy for the treatment of distal intracranial arterial occlusion strokes; initial experience with the micro-ADAPT technique[J]. *J Neurointerv Surg*, 2019, 11 (7) : 714-718.
- [82] ROMANO D G, FRAUENFELDER G, CARAGLIANO A, et al. Multicentric experience with an intermediate aspiration catheter for distal M2 ischemic stroke[J/OL]. *J Stroke Cerebrovasc Dis*, 2020, 29 (12) : 105389[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2020.105389>.
- [83] YOSHIMOTO T, TANAKA K, KOGE J, et al. Blind exchange with mini-pinning technique using the tron stent retriever for middle cerebral artery M2 occlusion thrombectomy in acute ischemic stroke[J/OL]. *Front Neurol*, 2021, 12: 667835[2024-10-11]. <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.667835>.
- [84] GUENEGO A, MINE B, BONNET T, et al. Thrombectomy for distal medium vessel occlusion with a new generation of stent retriever (Tigertriever 13) [J]. *Interv Neuroradiol*, 2022, 28 (4) : 444-454.
- [85] GOERTZ L, WEISS D, ABDULLAYEV N, et al. Safety and efficacy of the novel low-profile APERIO Hybrid17 for a treatment of proximal and distal vessel occlusion in acute ischemic stroke; a multicenter experience[J/OL]. *World Neurosurg*, 2022, 167: e386-e396[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2022.08.023>.
- [86] FISCHER S, WILL L, PHUNG T, et al. The Tigertriever 13 for mechanical thrombectomy in distal and medium intracranial vessel occlusions[J]. *Neuroradiology*, 2022, 64 (4) : 775-783.
- [87] GRIEB D, GREILING B, SCHULZ K, et al. Endovascular treatment of distal medium vessel occlusions using microcatheter aspiration thrombectomy[J]. *Interv Neuroradiol*, 2024, 30 (2) : 234-241.
- [88] ZHAO C H, KONERU M, SIEGLER J E, et al. Single center experience using 3 mm Trevo stent retrievers in medium vessel occlusion thrombectomy[J/OL]. *Interv Neuroradiol*, 2023: 15910199231199880[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1177/15910199231199880>.
- [89] NTOULIAS N, BREHM A, TSOBKAS I, et al. Initial experience with the Solitaire X 3 mm stent retriever for the treatment of distal medium vessel occlusions[J/OL]. *J Clin Med*, 2023, 12 (23) : 7289[2024-10-11]. <https://doi.org/10.3390/jcm12237289>.
- [90] PSYCHOGIOS M N, TSOBKAS I, BLACKHAM K, et al. The Quattro technique for medium distal vessel occlusion stroke[J]. *Clin Neuroradiol*, 2024, 34 (1) : 257-262.
- [91] ORSCÉLIK A, KALLMES D F, BILGIN C, et al. Comparison of balloon guide catheter versus non-balloon guide catheter for mechanical thrombectomy in patients with distal medium vessel occlusion[J]. *J Neurointerv Surg*, 2024, 16 (6) : 587-594.
- [92] MONTEIRO A, MAKALANDA H L D, WAREHAM J, et al. Mechanical thrombectomy in medium vessel occlusions using the novel aspiration Q catheters; an international multicenter experience[J]. *J Neurointerv Surg*, 2024, 16 (6) : 603-607.
- [93] ADUSUMILLI G, KOBEISSI H, GHOZY S, et al. Comparing Tigertriever 13 to other thrombectomy devices for distal medium vessel occlusion; a systematic review and meta-analysis[J/OL]. *Interv Neuroradiol*, 2023: 15910199231152510[2024-10-11]. <https://doi.org/10.1177/15910199231152510>.
- [94] HAUSSEN D C, AL-BAYATI A R, EBY B, et al. Blind exchange with mini-pinning technique for distal occlusion thrombectomy[J]. *J Neurointerv Surg*, 2020, 12 (4) : 392-395.
- [95] MEYER L, STRACKE C P, BROOCKS G, et al. Effect of anesthetic strategies on distal stroke thrombectomy in the anterior and posterior cerebral artery[J]. *J Neurointerv Surg*, 2024, 16 (3) : 230-236.

收稿日期: 2024-10-30

本文编辑: 栾璟煜